外臺秘要方卷第三十五 小兒諸疾上 三十六門

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞撿院上護軍臣林億等上進

小兒方序例論一首

小兒初生將護法一十七首

小兒初生將息法二首

小兒初受氣論一首

小兒變蒸方二首

相兒命長短法并論二十八首

小兒藏衣法五首

浴兒法一十一首

剃兒頭法一首

哺兒法三首

攘謝法一十二首

靜嘉堂文庫所藏

揀乳母法一首
小兒驚癇啼壯熱不喫嗞吐不已不小便方五首
小兒將息衣厚薄致生諸癇及諸疾方并灸法二十八首
小兒驚悸方二首
小兒夜啼方一十首
小兒驚夜啼方七首
小兒客忤方一十首
小兒齊瘕癖方六首
小兒痰結方二首
小兒因食痞滿羸瘦不下食肚脹方四首
小兒食不下及不消不嗜食方四首
小兒霍亂方一十二首
小兒霍亂雜療方六首
小兒吐痢方四首
小兒噦方二首
小兒口噤方四首
小兒重舌方并灸法一十三首
小兒鵝口鷰口方六首
小兒口瘡方五首
小兒口中涎出方三首
小兒舌上瘡脣腫方五首
小兒咽喉生瘡方二首
小兒喉痺方四首
小兒亭耳方四首
小兒鼻塞方四首

靜嘉堂文庫所藏

小兒方序例論一首

千金論曰夫生民之道莫不以養小爲大若無小卒不成大故易稱積小以成高大詩有厥初生民傳云聲子生隱公此之一義即是從微至著自少及長人情共見不待經史故今斯方先婦人小兒後丈夫耆老者則是崇本之義也小兒氣勢微弱醫人欲留心救療立功差難今之學者多不存意良由嬰兒在於襁褓之内乳氣腥臊醫者操行英雄詎肯瞻視靜而言之可爲太息者矣小品方云凡人年六歲以上爲小十六以上爲少三十以上爲壯五十以上爲老其六歲以下經所不載所以乳下嬰兒有病難療者皆爲無所承據也中古有巫妨者立小兒顱顖經以占夭壽判疾病死生世相傳授始有小兒方焉逮于晉宋江左推諸蘇家傳習有驗流於人間齊有徐王者亦有小兒方三卷故今之學者頗得傳授然徐氏位望隆重何暇留心於少小詳其方意不甚深細小有可採未爲至秘今博撰諸家及自經用有効者爲上下兩卷可披而尋之凡百居家皆宜達茲養小之術則無夭横之禍也出第五卷中

小兒初生將護法一十七首

崔氏療小兒亦生便以綿裹指拭口中及舌上青泥惡血此爲之玉衡（一作衡）若不急拭啼聲一發即入腹成百病矣

又療兒生落地不作聲方

取煖水一器灌之須臾自當啼

又見生不作聲者此由難産少氣故也可取兒臍帶向身却捋之令氣入腹仍呵之至百度啼聲自發

又方

以葱白徐徐鞭之即啼

又方

靜嘉堂文庫所藏

小兒亦生即當舉之舉之遲晚則令中寒腹內雷鳴
乃先浴之然後速斷臍不得以刀子割之須令人隔
單衣物咬斷兼將暖氣呵七遍然後纏結所留臍帶
當令長至兒足趺上短即中寒令兒腹中不調常下
痢若先斷臍然後浴者則臍中水中水則發腹痛其
臍斷訖連臍帶中若有蟲宜急剔撥去之不爾當
入兒腹成疾矣
又兒中水及中冷則令兒腹中絞痛夭糺啼呼面青黑此是中
水之過兒尿清（一云糞青）者冷也與兒臍中水即同方
當灸粉絮熨之不時治護臍至腫者當臍中隨輕重
重者便灸之乃可至八九十壯若輕者臍不大腫但
出汁時時啼呼者但擣當歸末和胡粉傅之仍灸
絮日日熨之至百日乃愈以啼呼止爲候

又兒初生法
宜用父故衣裹之若生女宜以母故衣勿用新帛切
須依之令兒長壽
又一期之內兒衣皆須用故綿帛爲之善兒衣綿帛特忌厚熱
愼之愼之
又兒洗浴斷臍訖襁抱畢未可與朱蜜宜與甘草湯取甘草可
中指一節搥碎以水二合煑取一合以綿纏沾取與
兒吮之可得一蜆殼入腹止兒當快吐吐去心胷中
惡汁也如得吐餘藥更不須與若不得吐可消息計
如飢渴須更復與之若前所服及更與並不得吐者
但稍稍與之令盡此一合止得吐去惡汁令兒心神
智惠無病也吮一合盡都不吐者是兒不含惡血耳
勿復與之乃可與朱蜜以鎭心神安魂魄也

靜嘉堂文庫所藏

又小兒初生三日中須與朱蜜只不宜多多則令兒脾胃冷腹脹喜陰癎氣急變噤痓而死也與朱蜜法

以眞經飛鍊朱如大豆以赤蜜一蜆殼和之以綿纏沾取與兒吮之得三沾止一日令盡此一豆許可三日與之則用三豆許也亦勿過過此則傷兒與朱蜜訖可與牛黃如朱蜜多少也牛黃益肝膽除熱定精神止驚辟惡氣除小兒百病三日後應開腸胃助穀神可研米作厚飲如乳酪厚薄以大豆粒多與嚥之嚥三豆許止日三與之滿七日乃可與哺也

又兒生十日始哺如棗核二十日倍之五十日如彈丸百日如棗若乳汁少不得依此法當用意少少增之若至二十日而哺者令兒無病兒若早哺之及多者令兒頭面身體喜生瘡愈而復發令兒尪弱難長乳兒不用太飽飽則令吐候兒吐者乳大飽也當以空乳乳之即消夏不去熱乳令兒嘔逆冬不去寒乳令兒欬痢乳母妳兒當先以手按散其熱氣勿令乳汁奔出以令兒噎如噎即便奪其乳令得氣息定復乳之如是十反五反視兒肌飽以節度之一日之中幾乳而足以爲常準又常捉去宿乳也乳母與兒卧當以臂與兒枕之使乳與兒頭平乃可乳之令兒不噎母欲睡即奪去其乳勿令填兒鼻納乳不知飢飽忌之

又兒初生著口噤不開不收乳方

赤足蜈蚣半枚去足炙令焦末研之絹篩以豬乳二合和之分三四服與之差

又兒著口噤體熱者方

煖竹瀝二合分四五服之

又兒新生慎不可逆灸灸之忍痛動其五脉因喜成癎是以田
舍小兒任其自然皆無此夭也
又兒初生有鵝口者其舌上有白屑如米劇者鼻外亦有療之法
以髪纏筋頭沾井花水撩拭之三旦一如此便去不者
可煮栗荴汁令濃以綿纏筋頭沾拭之無栗荴煮栗
木皮如井花水法千金同並出第十上卷中
文仲療兒生有連舌舌下有膜如石榴子中隔連其舌下微微
喜令兒語不發不轉法
以爪摘斷之微有血出無害若血出不止可燒髪作
末以傅之即止千金同
又兒初生六七日後血氣收斂成肉則口舌喉頰裏清淨也若
喉裏舌上有物如蘆蘀盛水狀者若懸癰有脹起者以綿纏長
針留刃處如粟米許大以刺決之令氣洩去青黃赤血汁也一
刺之止消息一日若不消又刺之不過三刺自消或餘小小未
消三刺之亦止自然消也有著舌下如此者名重舌有著頰裏
及上腭如此者名重腭有著齒齗上者名重齗皆刺之去血汁
畢止千金同
又療兒初生出腹骨肉未斂肌肉猶是血也血凝乃堅成肌肉
耳其血阻（一作沮）敗不成肌肉則使面目繞鼻口左右悉黃而啼（一作不啼）
閉目聚口撮面口中乾燥四肢不能伸縮者皆是血脉不斂
也喜不育如此者宜與龍膽湯方在客忤部中十味者是也
千金同

兒初生將息法二首

千金兒初生不可令衣過厚熱令兒傷皮膚害血脉發雜瘡而黃
又小兒始生肌膚未成不可暖衣暖衣則令筋骨緩弱宜時見
風日若都不見風日則令肌膚脆軟便易中傷皆當以故絮衣

靜嘉堂文庫所藏

之勿用新綿也天和暖無風之時令母將於日中嬉戲數見風日則血凝氣剛肌肉牢密堪耐風寒不致疾病若常藏於幃帳之中重衣溫暖譬猶陰地之草木不見風日軟脆不堪風寒也出第五卷中

小兒初受氣論一首

崔氏論曰凡小兒初受氣在娠一月結胚二月作胎三月有血脉四月形體成五月能動六月筋骨立七月毛髮生八月藏腑具九月穀氣入胃十月百神能備而生矣生後六十日目瞳子成能咳笑應和人百五十日任脉生能反覆百八十日尻骨成能獨坐二百一十日掌骨成能匍匐三百日臏骨成能獨倚三百六十日為一期膝骨成乃能行此其定法若有不依期者必有不平之處

小兒變蒸論二首

崔氏小兒生三十二日一變六十四日再變兼蒸九十六日三變百二十八日四變又蒸百六十日五變百九十二日六變又蒸二百二十四日七變二百五十六日八變又蒸二百八十八日九變三百二十日十變又蒸此小變蒸畢也後六十四日又蒸蒸後六十四日又一大蒸蒸後百二十八日又一大蒸此大小蒸都畢也凡五百七十六日乃成人所以變蒸者皆是榮其血脉改其五藏故一變畢輒覺情態忽有異也其變蒸之候令身熱脉亂汗出目睛不明微似欲驚不乳哺上脣頭小白泡起如珠子耳冷尻亦冷此其診也單變小微兼蒸小劇先期四五日便發發後亦四五日歇凡蒸平者五日而衰遠至七日九日而衰當變蒸之時慎不可療及灸刺但和視之若良久熱不已可微與紫丸熱歇便止若於變蒸中加以天行溫病或非變蒸而得天行者其診皆相似唯耳及尻通熱口上無白泡耳當

靜嘉堂文庫所藏

先服黑散以發其汗汗出温粉粉之熱當歇便就差若猶不都除乃與紫丸下之其間節度甚多恐悠悠不能備行今略疏其經要者如此

又黑散方

麻黄一分去節 大黄一分 杏人二分去皮尖熬令變色

右三味先擣麻黄大黄為散杏人別擣如脂乃細細内散又擣令調和訖内密器中一月見服如小豆大一枚以乳汁和服之抱令得汗汗出温粉粉之勿使見風百日見服如棗核以見大小量之為度

又紫丸方

代赭 赤石脂各一兩 巴豆三十枚去心皮熬 杏人五十枚去尖皮熬

右四味擣代赭等二味為末巴豆杏人別擣如膏又内二味合擣三千杵自相和若硬入少蜜更擣密器中盛封之三十日見服如麻子一丸與少乳汁令下喉食頃後與少乳勿令多至日中當小下熱除若未全除明旦更與一丸百日見服如小豆一丸以此準量增減也小兒夏月多熱喜令發疹二三十日輒一服甚佳此丸無所不治代赭須真者若不真以左顧牡蠣代之忌豬肉蘆笋並出第十上卷中

相兒命長短法并論二十九首

千金翼見生枕骨不成者能言而死 膝骨不成者能倨而死 掌骨不成者能匍匐而死 踵骨不成者能行而死 臏骨不成者能立而死 身生不收者死 魚口者死 股間無生肉者死 頤下破者死 陰不起者死 囊下白者死赤者死

相法甚博略述十數條而已

見初生陰大而與身色同者成人 見初生額上有旋毛早貴

妨父母　見初生叫聲連延相屬者壽聲絶而復揚急者不壽
見初生汗血者多厄不壽　見初生目視不正數動者大非佳人
見初生自開目者不成人　見初生通身軟弱如無骨者不成
人　見初生髮稀少者不聽人　見初生臍小者不壽
見初生早坐早行早語早齒生惡性者非佳人　見初生頭四
破者不成人　見初生頭毛不周匝者不成人　啼聲散不成人
啼聲深不成人　汗不流不成人　小便凝如脂膏不成人
常摇手足者不成人
無此狀候者皆成人
見初生臍中無血者好卵下縫通達黒者壽鮮白長大者壽
論曰見三歲以上十歲以下觀其性氣高下即可知其夭壽兒
小時識悟通敏過人者多夭則項託顔回之流是也小兒骨法
成就威儀迴轉遲舒稍費人精神彫琢者壽其預知人意迴旋
敏速者亦夭則楊脩孔融之徒是也由此觀之夭壽大略可知
也亦由梅花早發不覩歲寒甘菊晚榮終於年事是晚成就者
壽之兆也並出第十一卷中
小兒藏衣法五首
崔氏凡藏兒衣法
兒衣先以清水洗之勿令沙土草汚又以清酒洗之
仍内錢一文在衣中盛於新瓶内以青帛裹之其瓶
口上仍密蓋頭且置便宜處待滿三日然後依月吉
地向陽高燥之處入地三尺埋之瓶上土厚一尺七寸
唯須牢築令兒長壽有智惠若藏衣不謹爲豬狗
所食者令兒癲狂蟲蟻食者令兒病惡瘡犬鳥食之
令兒兵死近社廟傍者令兒見鬼近深水洿池令兒
溺死近故竈傍令兒驚惕近井傍者令兒病聾盲弃

靜嘉堂文庫所藏

道路街巷者令兒絶嗣無子當門戶者令兒聲不出耳聾著水流下者令兒青盲棄於火裏者令兒生㿈瘡著林木頭者令兒自絞死如此之忌皆須慎之

又安產婦及藏衣天德月空法

正月（天德在丁 月空在丙壬）二月（天德在坤 月空在甲庚）三月（天德在壬 月空在丙壬）四月（天德在辛 月空在甲庚）

五月（天德在乾 月空在丙壬）六月（天德在甲 月空在甲庚）七月（天德在癸 月空在丙壬）八月（天德在艮 月空在甲庚）

九月（天德在丙 月空在丙壬）十月（天德在乙 月空在甲庚）十一月（天德在巽 月空在丙壬）十二月（天德在庚 月空在甲庚）

凡藏兒衣皆依此法天德月空處埋之若有遇反支者宜以衣內新瓶盛密封塞口挂於宅外福德之上向陽高燥之處待過月然後依法埋藏之大吉

又法

甲寅旬日十日不得藏埋兒衣以瓶盛密封安置空處度十日即藏埋之

又法

甲辰乙巳丙午丁未戊申此五日亦不藏兒衣還盛瓶中密塞勿令氣通挂著兒生處過此五日即埋之亦不得更過此日

又法

甲乙日生兒丙丁日藏衣吉丙丁日生兒戊巳日藏衣吉戊巳日生兒庚辛日藏衣吉庚辛日生兒壬癸日藏衣吉並出第十上卷中

浴兒法一十一首

崔氏初生浴兒良日此謂初生浴兒以後重浴亦吉寅卯酉日大吉壬午丁未癸巳日凶

又浴兒虎頭骨湯主辟除惡氣兼令兒不驚不患諸瘡疥方

虎頭骨（五大兩炙頭身骨亦得碎） 苦參（四兩） 白芷（三兩）

靜嘉堂文庫所藏

右三味切以水一斗煮爲湯内豬膽汁少許適寒温以浴兒良

又療兒若卒客忤中人吐下不乳哺面青黄色變弦急者以浴之方

取錢七十文以水三斗煮令有味適寒温浴兒良

又療兒生三日浴除瘡方

桃根　李根　梅根各八兩

右三味切以意著水多少煮令三四沸以浴兒

又療少小卒寒熱不佳不能服藥六物莽草湯浴兒方

莽草　丹參　蛇牀子　桂心各三兩

昌蒲半斤　雷丸一斤

右六味㕮咀以水三斗煮三五沸適寒温浴兒避日向陰處

又療少小身熱一物李葉湯方

李葉無多少以水煮去滓以浴兒良忌準前

又方

白芷煎湯浴兒佳根苗皆得

又方

苦參湯浴兒良

又凡尋常浴兒不緣别療諸病只就浴者方

湯熟添少許清漿水一捻鹽浴兒浴訖以粉摩兒既不畏風又引散諸氣

又兒不用數浴數浴多背冷令兒發癇其湯必適寒温得所

又療少小壯熱不能服藥宜此十二物寒水石粉散方

寒水石　芒消　滑石　石膏

赤石脂　青木香　甘草炙　大黄

黄芩　芎藭　麻黄去節　牡蠣熬

右藥各等分擣篩以粉一升和藥屑三合復下篩以粉粉兒日三熱退即止本方有防風無牡蠣

又少小盜汗三物黄連粉方

黃連 牡蠣熬 貝母

右藥各等分擣篩以粉粉兒良出第十上卷中

剃兒頭法一首

崔氏初剃兒頭良日寅丑日吉丁未日凶

哺兒法三首

崔氏初哺兒良日以平定成日大吉其哺不得令鹹

又方寅丑辰巳酉日良

又方男戊己日不得女丙丁日不得

禳謝法一十二首

崔氏軒轅者乾坤天丞相使者風伯犯之令兒驚吐可取梨枝六十寸埋生處大吉

雷公者震神太陰使者天馬犯之令兒煩悶腹滿解之以三屠家內為餅於產處謝之大吉

咸池者坎神天之雨師使者犯之令兒啼不止用羊脯酒於生處謝之吉

豐隆者艮神天之東明使者天僕也害氣犯之令兒乍寒乍熱大腹以白魚二枚於生處謝之又大豆一升投井中亦大吉

招揺者坤神天上使者犯之令兒驚空爵不止以酒餅生處謝之即愈

天候者巽神天一執法使者犯之令兒腹脹張眼以白魚二枚於生處謝之吉

吴時者离神天一將軍遊擊使者犯之令兒驚腹痛用馬脯五寸於生處謝之吉又以白魚五枚并棗餅埋其生處吉

大時者兌神小時北斗使者犯之令兒腹脹下痢解之以酒脯於生處謝之又以大豆一升投井中吉

犯月殺者令兒驚啼用丹雄雞血於生處謝之吉

犯白虎者用稻米一升雞子三枚於生處謝之吉黍米亦得

犯大夫者用羊肝三枚及稻米一升於生處謝之吉又用雞豚羊髀黍米亦得

犯日遊者令兒口噤色變欲死者用三屠家肉麥餅於生處謝之吉

揀乳母法一首

崔氏乳母者其血氣為乳汁也五情善惡悉血氣所生其乳兒者皆須性情知善形色不惡相貌稍通者若求全備不可得也但取不孤臭瘻癭氣嗽瘑疥癡瘙白禿癧瘍瀋脣耳聾齆鼻癲癇無此等疾者便可飲兒師見其身上舊灸瘢即知其先有

靜嘉堂文庫所藏

所疾切須愼耳

劉氏療小兒眠睡不安驚啼不吺妳虎睛丸方（小兒熱甚神効）

犀角（十二分屑）　子芩（五分）　梔子人　大黃（各十分）

虎睛（一枚研）

右五味擣篩蜜和如梧子大每服七丸大小量之妳母忌熱麪

小兒熱風癇以乳汁或竹瀝研三丸服之漸增以差爲度

小兒百日以下蓐內壯熱以妳汁研四丸與服即差

又療小兒初生不吺妳方

以乳兩合葱白一寸和煎一兩沸去葱與吺即能吺乳立效以蛤蝻灌之

又療小兒吺妳不穩三日至七日以來覺壯熱顏色赤及鼻孔黃即恐作撮口及孩子牙關裏有蟲似以蝸牛亦似黃頭白蜂螺者方

燒竹取瀝半合和少許牛黃與吺即差又以豬肉拭口即引蟲出或自消便差

又療小兒初生吐不止方

人乳（二合）　蘧蒢篾（少許）　鹽（兩粟米大）

右三味煎三兩沸牛黃兩米許研和與服即差止

又小兒初生不小便方

人乳（四合）　葱白（一寸）

右二味相和煎分爲四服即小便利神效

小兒將息衣裳厚薄致生諸癇及諸疾方并灸法二十八首

廣濟療小兒驚癇體羸不堪療子母五癇煎方

鈎藤（二分）　知母　子芩（各四分）　甘草（炙）

靜嘉堂文庫所藏

升麻　沙參各三分　寒水石六分　蚱蟬一枚去翅炙

蜣蜋三枚炙

右九味擣篩以好蜜和薄泔著銅鉢於沸湯上調之攪不停手如飴糖煎成稍稍別出少許一日兒啖之一枚棗核大日夜五六過服不妨五六日兒啖之三枚一百日兒啖四枚二百日兒至三百日兒啖五枚三歲兒啖七枚以意量之

小品云玄中記曰天下有女鳥一名姑獲又名釣星鬼也喜以陰雨夜過飛鳴徘徊人村里喚得來也是鳥淳雌無雄不產喜落毛羽於中庭置入兒衣中便使兒作癎必死即化爲其兒也是以小兒生至十歲衣裳不可露七八月尤忌之

千金夫癎病小兒之惡病也或有不及求醫而致困者然氣發於內必先有候常宜審察其精神而采其候也手白肉魚際脉累者是癎候魚際脉赤者熱脉青大者寒青細者爲平也

又鼻口乾燥大小便不利是癎候　又眼不明上視喜陽是癎候　又耳後完骨上有青絡盛臥不靜是癎候脉青大刺之令血出　又小兒髮逆上啼哭面暗色不變是癎候　又鼻口青時小驚是癎候　又意氣下而妄怒是癎候　又身熱小便難是癎候　又吐痢不止厥痛時起是癎候　又身熱目時直視是癎候　又目閉青時小驚是癎候　又咽乳不利是癎候　又身熱頭常汗出是癎候　又目瞳子卒大黑於常時是癎候　又身熱吐哯而喘是癎候　又喜欠目上視是癎候　又臥惕惕而驚手足振搖是癎候　又身熱目視不精是癎候　又臥夢笑手足動搖是癎候　又弄舌搖頭是癎候

以上諸候二十條皆癎之初也見其候便當爪其陽脉所應灸爪之皆重手令兒驟啼及足脉絶亦依方與湯

又直視瞳子動　腹滿轉鳴　下血身熱　口噤不得乳　反張脊強　汗出發熱　爲臥不悟　手足掣瘲喜驚　凡八候癎之劇也如此非復湯爪所能救便當時灸之妙

又小兒驚啼眠中四肢掣動變蒸未解愼不可針灸爪之動其百脉仍因驚成癎也惟陰癎噤痓可針灸爪之凡灸癎當先下兒使虛乃承虛灸之未下有實而灸者氣逼前後不通殺人也

靜嘉堂文庫所藏

又癇平旦發者在足少陽　黃昏發者在足太陰　日中發者在足太陽　夜半發者在足少陰　人定發者在足陽明　晨朝發者在足厥陰

右癇發時節病所在視其發早晚灸其所也

又五藏之癇六畜之癇或在四肢或在腹內審察其候隨病所在灸之雖少必差若失其要則爲害也

肝癇之爲病面青目反視手足搖 灸陽明太陰各三炷

心癇之爲病面赤心下有熱短氣息微數 灸心下第二肋端宛宛中此爲巨闕也又灸手心主及少陰各三炷

脾癇之爲病面黃腹大泄痢 灸胃管三壯俠胃管傍各二壯足陽明太陰各二炷

肺癇之爲病面目白口沫出 灸肝愈二壯又灸太陰二炷

腎癇之爲病面黑正直視不搖如尸狀 灸心下二寸二分三壯又灸肘下動脉各二壯

膈癇之爲病目反四肢不舉 灸風府又灸頂上鼻人中下脣承漿皆隨年壯

腸癇之爲病不動搖 灸兩承山又灸足心兩手勞宮又灸兩耳後完骨各隨年壯又灸臍中可五十壯

右五藏癇證候

又馬癇之爲病張口搖頭馬鳴欲反折 灸項風府臍中三壯病在腹中燒馬蹄末服

牛癇之爲病目正直視腹脹 灸鳩尾上及大椎各三壯燒牛蹄灰末服

雞癇之爲病延頸反折喜驚自搖 灸足諸陽各三壯

羊癇之爲病喜揚目吐舌 灸大椎上三壯

豬癇之爲病喜吐沫 灸完骨兩傍各一寸七壯

犬癇之爲病手屈拳攣 灸兩手心一壯灸足太陽各一壯灸肋戶兩脇頭兩穴各一壯良

右六畜癇證候

凡諸反張大人脊下容側手小兒容三指者不可療也　又若目反上視瞳子動當灸顖中取之法橫度口盡兩吻際又橫度鼻下亦盡兩邊折去鼻度半都合口爲度從額上髮際上行度之灸度頭一處正在顖上未合骨中隨手動者是此最要處也　次灸當額上入髮際二分許直望鼻爲正也　次灸其兩邊當目瞳子直上入髮際二分許　次灸頂上迴毛中　次灸客主人穴在眉後際動脈是也　次灸兩耳門當耳關口則骨解開動張陷中是也　次灸兩耳上捲耳取之當捲耳上頭是也　一法大人當耳上橫三指小兒各自取其指也　次灸兩耳後完骨上青脉亦可以針刺令血出

靜嘉堂文庫所藏

次灸玉枕項後高骨是也 次灸兩風池穴在項後兩轅筋外髮際陷中是也 次灸風府當項中髮際亦可與風池三處高下相等 次灸頭兩角兩角當迴毛兩邊起骨是也

右頭部凡二十九處兒生十日可灸三壯三十日灸五壯五十日灸七壯病重者具灸之輕者唯灸顖中風池玉枕也艾使熟炷令平正著肉火勢乃至病所也艾若生炷不平正不著肉徒灸多炷無益也

又若腹滿短氣轉鳴灸肺募穴在兩乳上第二肋間宛宛中垂繩取之當瞳子是也 次灸膻中 次灸胷堂 次灸臍中 次灸辟息穴辟息在兩乳下第一肋間宛宛中是也 次灸巨闕穴巨闕大人鳩尾下一寸小兒去臍作六分分之去心鳩尾下一寸是也并灸兩邊 次灸胃管 次灸金門穴金門在穀道前囊之後當中央是也從陰囊下度至大孔前中分之

右腹部一十二處胷堂巨闕胃管十日兒三炷一月以上可五炷陰下縫三炷或云隨年壯以灸之

又若脊強反張灸大椎并灸諸藏俞及督脊上當中央從大椎度至窮骨中屈更從大椎度之灸度下頭是督脊也

右背部一十二處十日兒灸三壯一月以上灸五壯

又若手足掣瘲驚者灸赤澤 次灸陽明 次灸少商 次灸勞宮 次灸心主 次灸合谷 次灸三間穴 次灸少陽

右手部一十六處其要者陽明少陽心主尺澤合谷少商也壯數如上

又灸伏兔 次灸三里 次灸腓腸 次灸鹿溪 次灸陽明 次灸少陽 次灸然谷

右足部一十四處皆要可灸如上壯數手足陽明謂人四指凡小兒驚癇皆灸之若風病大動手足掣瘲者盡灸手足十指端又灸本節後

又論曰若病家始發便來告師師可診候所解爲法作次序療之以其節度首尾取差也病家已經雜療無次序不得制病病則變異其本候後師便不知其前證虛實直依其後證作療亦不得差也要應精問察之爲前師貫首所配依取其前蹤續以爲療乃無逆耳前師處湯本應數劑乃差而病家服

靜嘉堂文庫所藏

一兩劑求効便謂不驗巳後更問他師師不尋前人爲療寒温次序而更爲療而不依次前師療則斃也或前巳下之後須平和療以接之而得差也或前人未下之或不去者或前療寒温失度後人應調理之是爲療敗病皆須邀射之然後免耳不依次第及不審察必反重斃也又茵芋丸療少小有風癎疹至長不除或遇天陰節變便發動食飲堅強亦發百脉攣縮行步不正言語不便者服之不發方

茵芋（葉炙）　鉛丹（熬）　鈎藤（皮炙）　杜蘅
防葵　石膏（研）　秦艽（各四分）　昌蒲
黃芩（各六分）　松蘿（二分）　蜣蜋（十枚炙）　甘草（十四分炙）

右十二味擣篩丸如小豆三歲以下服五丸三歲以上服七丸五歲以上服十丸十歲可至十五丸大小量之

又神農本草經說小兒驚癎有一百二十種其證候微異於常便是癎候也初出胎血脉不斂五藏未成稍將養失宜即爲病也時不成人其經變蒸之後有病餘證並覔見唯中風最暴卒也

又小兒四肢不好驚掣氣息小異欲作癎

又凡小兒不能乳哺當與紫丸下之小兒始生生氣尚盛但有微惡則須下之必無所損及其愈病則致深益及變蒸日滿不解者並宜龍膽湯也（方在客忤中）若不時下則成大病病成則難療矣凡下四味紫丸最善雖下不損人足以去疾若四味紫丸不得下者以赤丸下之赤丸不下當倍之若已下而有餘熱不盡當按方作龍膽湯稍稍服之并摩赤膏風癎亦當下之然以豬心湯下之驚癎但按圖灸之及摩膏不可大下也何者驚癎心氣不定下之内虛益令甚耳驚癎甚者特爲難治如養小常愼驚勿令兒聞大聲抱持之間當安徐勿令怖也又天雷時便掩塞兒耳并作餘細聲以亂之

靜嘉堂文庫所藏

凡養小兒皆微驚以長血脉但不欲大驚大驚乃灸驚脉若五六十日灸者驚復重甚生百日後灸驚脉乃善

治少小心腹熱除熱丹參赤膏方

丹參　雷丸　芒消　戎鹽

大黄各三兩

右五味切以苦酒半升浸四種一宿以成鍊豬脂一斤煎三上三下去滓内芒消膏成以摩心下冬夏可用一方但參丹雷丸亦佳並出第五卷中

千金翼凡小兒之癇有三種有風癇有驚癇有食癇然風癇驚癇時時有耳十人之中未有一二是食癇者凡是先寒後熱發癇者皆是食癇也驚癇當按圖灸之風癇當與豚心湯下之食癇當下乃愈紫丸佳凡小兒所以得風者緣衣暖汗出風因而入也風癇者初得之時先屈指如數乃發作此風癇也驚癇者起於驚怖先啼乃發作此驚癇也驚癇微者急療勿復驚之或自止也其先不哺乳吐變熱後發癇此食癇也早下則差四味紫丸逐澼飲最良去病速而不虛人赤丸差駃病重者當用之

小兒衣甚寒薄則腹中乳食不消其大便皆酢臭此欲為癖之漸也便將紫丸以微消之服法先從小起常令大便稀勿使大下也稀後便漸減之不酢臭乃止藥

又凡小兒冬月下無所畏夏月下難差然有病者不可不下後腹中當小脹滿故當節哺乳將紫丸數日又乳哺小兒常令多少有常劑兒漸大當稍稍增之若減少者此腹中已有小不調也便微服藥停哺但與乳甚者十許日微者五六日止哺自當如常若不肯哺而欲乳者此是癖為重要當下之無不差者不下則致寒熱或反吐而發癇或更致下痢此皆病重不早下之

靜嘉堂文庫所藏

所爲也此爲難療

又凡小兒有熱不欲哺乳臥不安又數驚此癇之初也服紫丸便愈不差更服之兒立夏後有病療之慎勿妄灸不欲吐下但以除熱湯浴之除熱散粉之除熱赤膏摩之又臍中以膏塗之令兒在涼處勿禁水漿常以新水飲之

又凡小兒矢黃而臭者此腹中有熱宜微將服龍膽湯若白而酢者此寒不消也當服紫丸微者少與藥令內消甚者小增令小下皆湏節乳哺數日令胃氣平和若不節乳哺則病易復復下之則傷其胃氣令腹脹滿再三下之尚可過此傷矣並出第十一卷中

備急療少小百二十種癇病胷中病蛇蛻皮湯方

蛇蛻皮三寸炙　細辛　甘草炙　鈎藤

黃耆各二分　大黃四分　蚱蟬四枚炙　牛黃五大豆許

右八味切以水二升半煑取一升一合百日兒一服二合甚良

若窮地無藥物可一二味亦合不可備用然大黃一味不得闕常用效

又療少小二十五癇大黃湯方

甘草炙　大黃　甘皮　當歸各一兩

細辛半兩

右五味擣篩以指撮著水一升煑取二合一歲兒服一合日二

古今錄驗赤湯療二十五種癇吐痢寒熱百病不乳哺方

大黃五兩　當歸　芍藥　黃芩

栝樓　甘草炙　桂心　人參

赤石脂　牡蠣熬　紫石英　麻黃去節各二兩

右十二味擣篩令調盛以韋囊八歲兒以乾棗五枚用水八合煑棗取五合兩指撮藥入湯中煑取三沸去滓與兒服之取利微汗自除十歲用棗十枚三指撮藥水一升煑三沸服

靜嘉堂文庫所藏

之此湯療小兒百病及癎神驗

又療未滿月及出月兒壯熱發癎鈎藤湯方

鈎藤分 蚱蟬一枚去翅熬末湯成下 柴胡 升麻

黃芩各二分 蛇脫皮二十炙 甘草炙 大黃各二分

竹瀝三合 石膏三分碎

右十味切以水一升煑取三合半和竹瀝服一合得利見湯色出停後服至五十六十日兒一服一合乳母忌海藻菘菜等

崔氏云若連發不醒加麻黃一分去節

又療百日及過百日兒發癎連發不醒及胎中帶風體冷面青反張宜服麻黃五癎湯方

麻黃去節 羌活 乾葛 甘草炙

枳實各二分炙 杏人二十枚去皮尖碎 升麻 黃芩去腸

大黃各四分 柴胡 芍藥各三分 鈎藤皮一分

蛇蛻三寸炙 蚱蟬二枚去翅炙 石膏六分碎

右十五味切以水二升并竹瀝五合煎取六合每服一合佳

小兒驚悸方二首

必効鈎藤湯療小兒壯熱時氣驚悸并熱瘡出方

鈎藤 人參 蚱蟬炙 子芩各一分

蛇蛻皮三寸炙 龍齒四分碎 防風 澤瀉各二分

石膏一兩碎 竹瀝三合

右十味切以水二升并竹瀝煎取七合細細服之以差為度

又方

茯神 蚱蟬二分炙各 龍齒碎 麥門冬去心各四分

人參三分 鈎藤一分 牛黃兩大豆許研 杏人十二枚去皮尖碎

蛇蛻皮三寸炙末入

右九味切以水二升煎取六合去滓下牛黃末分六服消息

靜嘉堂文庫所藏

服之令盡差

小兒夜啼方一十首

小品療小兒夜啼一物前胡丸方

前胡隨多少

右一味擣篩蜜丸如大豆服一丸日三加至五六丸以差爲度千金同

又方

以妊娠時食飲偏有所思者以哺兒則愈千金同

千金療小兒夜啼不已醫所不治者方

取狼糞中骨燒作灰水服如黍米粒一枚即定

又療小兒夜啼至明不安寐芎藭散方

芎藭 防已 白朮各二分

右三味擣篩以乳和之與兒服之量多少又以兒母手掩臍中亦以摩兒頭及脊驗二十日兒未能服散者以乳汁和之服如麻子一丸

又方

交道中土 伏龍肝各一把

右二味以絹篩水和少許服之差

又方

取馬骨燒灰傅乳上飲兒啼即止並出第五卷中

備急或常好啼方

取犬頭下毛以絳囊盛繫兒兩手立效

必效小兒夜啼方

以日未出時及日午時仰臥著於臍上横文屏氣以朱書作血字其夜即斷聲效

古今録驗小兒夜啼如腹痛方

靜嘉堂文庫所藏

䗪蟲熬令煙盡 芍藥炙 芎藭熬各等分

右三味擣末服如刀圭日三以乳服之

又療小兒夜啼不止腹中痛宜以乳頭散方

黃耆 甘草炙 當歸 芍藥

附子炮 乾薑各等分

右六味爲散以乳頭飲兒丸可胡豆三丸大小量之

小兒驚夜啼方七首

廣濟療小兒五驚夜啼龍角丸方

龍角 黃芩 大黃各二分 牡丹皮一分

蚱蟬一枚炙 牛黃小豆大五枚

右六味擣篩蜜和丸如麻子少小以意增減之甚良千金牡丹作牡

崔氏名五驚丸

千金療小兒驚啼方

以雞屎白熬末以乳服少許

又方 以臘月縛豬繩燒灰服之

又方 燒猬皮三寸灰著乳頭飲兒

又方 車轄脂如小豆許内口中及臍中差

又小兒因宿乳不消腹痛驚啼牛黃丸方

大附子二枚炮去皮 牛黃三銖 巴豆去心皮熬 杏人去尖皮熬別擣

眞珠各一兩研

右五味擣附子眞珠下篩別擣巴豆杏人令如膏内附子及牛黃擣一千二百杵若乾入少蜜足之百日兒服如粟米一丸三歲兒服如麻子一丸五六歲兒服如胡豆一丸日二先乳哺了服之鬲上下悉當微轉藥宍出者病愈散出者更服

並出第五卷中

文仲隱居効方小兒夜啼不安此腹痛故至夜輒劇狀似鬼禍

靜嘉堂文庫所藏

五味子湯方

五味子　當歸　芍藥　白朮（各四分）

甘草（炙）　桂心（各二分）

右六味切以水一升煎取五合分服之增減量之

小兒客忤一十首

千金論曰少小所以有客忤病者是外人來氣息忤之一名中人爲客忤也雖是家人或別房異戶或乳母父母從外還衣服或經履鬼神麤惡暴氣或牛馬之氣皆爲忤也發作喘息乳氣未定者皆爲客忤其乳母遇醉及房勞後乳兒最劇能殺兒也不可不愼

又論曰凡中客之爲病皆頻吐下青黃白色水穀解離腹痛夭糺面色變易其候似癇但眼不上插耳其脉急數者是也宜與龍膽湯下之

又龍膽湯療嬰兒出腹血脉盛實熱温壯四肢驚掣發熱大吐哯者若已能進哺中食不消壯熱及變蒸不解中客人魃氣并諸驚癇方悉主之小兒皆服之小兒龍膽湯第一此是新出腹嬰兒方若日月長大者以次依此爲例若必知客忤及有魃氣者可加人參當歸各如龍膽秤分多少也一百日兒加半分二百日兒加一分一歲兒加半兩餘藥皆準爾

龍膽　釣藤皮　柴胡　黃芩

桔梗　芍藥　茯神　甘草（炙各一分）

蜣蜋（炙二分）　大黃（四分）

右十味切以水一升煎取五合爲劑也服之如後節度藥有虛實虛藥宜足數合水也兒生一日至七日分取一合爲三服生八日至十五日分取一合半爲三服生十六日至二十餘日至四十日者盡以五合爲三服十歲亦準此得下即止勿復

靜嘉堂文庫所藏

服也
又少小卒客忤不知人者方
取新熱馬屎一枚絞取汁飲兒下便愈亦治中客忤
而啼面青腹強者
又少小見人來卒不往腹中作聲者二物燒髮散方
用向來者人頭上髮十莖斷兒衣帶少許合燒灰細
末和乳飲兒即差
又少小中忤人一物馬通浴湯方
用馬通三升火燒令煙盡以酒一斗煑三沸去滓以
浴兒即差
又凡乘馬行還得汗氣臭又未盥洗易衣裝而便向兒邊令兒
中馬客忤兒忽卒見馬來及聞馬鳴驚及馬上衣物馬氣皆令
兒中馬汗氣及客忤慎護之持重一歲兒也一云護之持黒中
又凡非常人及諸物從外來亦驚小兒致病欲防之法諸有從
外來人及有異物入戶當將兒迴避之勿令見也若不避者即
燒牛糞令有煙氣置戶前則善
又方
吞麝香如大豆許立愈
又療少小客忤二物黃土塗頭方
以竈中黃土熟者曲蟮糞等分合擣如雞子黃大
塗兒頭上及五心良一方雞子清和如泥
又療小兒犯客忤發作有時方
取母月衣覆兒上大良
又療卒客忤方
剪取驢前髆胛上旋毛大如彈丸以乳汁煎之令毛
消藥成著乳頭飲之下喉即愈
又療小兒卒客忤方

靜嘉堂文庫所藏

銅鑑鼻燒令赤投少許酒中大兒飲之小兒不能飲者含與之即愈並出第五卷中

小兒癥瘕癖方六首

廣濟療少小及大人腹中宿食積成癥癖兩脅妨滿氣息喘急不能食面黃日漸瘦腹大脹硬除百病紫雙丸方

代赭研　丹砂研　大黃各八分　青木香

當歸各五分　桂心四分　犀角三分屑　巴豆六分去心皮別擣

右八味擣篩蜜和丸如梧子大人小兒量之十歲兒服大豆二丸六歲者小豆許二丸以下臨時斟酌要瀉病出爲度又疾日一丸以溏洩而已不在猛瀉忌如常法

又療小兒痃癖發腹痛不食黃瘦鼈甲丸方

鼈甲炙　郁李人各八分　防葵　人參各五分

訶黎勒七顆皮　大黃四分　桑菌三分

右七味擣篩蜜丸大小量之以酒飲乳服五丸至十丸

千金牛黃鼈甲丸療小兒癖實癖腫壯熱食不消化中惡忤氣方

牛黃二分　鼈甲炙　麥麴熬　柴胡

大黃　枳實炙　芎藭各兩　厚朴炙

茯苓　桂心　芍藥　乾薑各半兩

右十二味擣篩蜜丸如小豆日三服以意量之

又療小兒心下生痞淡澼結聚腹大脹滿身體壯熱不欲哺乳芫花丸方

芫花　黃芩各四分　大黃　雄黃細研各十銖

右四味擣篩爲末蜜和更擣一千杵三歲兒至一歲以下服如粟米一丸欲服丸內兒喉中令母與乳若長服消病者當以意消息與服之與乳哺相避良

靜嘉堂文庫所藏

又療小兒痰實結聚宿癖羸露瘦不能飲眞珠丸方

眞珠半兩研　麥門冬一兩去心　蕤人五十枚一云二百箇　巴豆七枚去心皮熬一云四十枚

右四味擣篩蜜和丸暮歲兒服二丸小豆大二百日兒服如麻子二丸漸增以知爲度當下病赤黃白黑葵汁勿絕藥病盡下自止又服令小兒肥白無病已試驗並出第五卷中

劉氏療小兒冷癖痃癖氣不下食瘦時時肋下痛方

防葵　當歸　枳實炙　厚朴炙

楮實　人參　黃耆　茯神

白朮　訶黎勒皮各八分　牛膝　郁李人去皮

柴胡　大麻人　芍藥　橘皮

防風　紫菀洗去土　薏苡人各六分　鱉甲炙

三稜根各十二分　桂心七分　仙鼠二枚如無以糞三合代　大附子二枚炮

乾薑末二分　甘草炙　乾地黃各十分　大黃十分

五味子四分　檳榔人四顆

右三十味擣篩蜜丸如梧子大小增減以意量之須飲服之良

小兒淡結方二首

千金療少小宿食癖氣淡飲往來寒熱不欲食消瘦芒消紫丸方

芒消四分熬　大黃四兩　半夏二兩洗　代赭一兩

甘遂二兩熬　巴豆三百枚去心皮熬　杏人一百二十枚去尖皮熬別擣

右七味擣篩別治巴豆杏人令如膏稍內藥末擣數千杵令相和如強內少蜜百日兒服如胡豆一丸過百日至一歲服二丸隨兒大小以意節度之當候兒大便中藥出爲愈若不出復與加㓲出第五卷中

古今錄驗療八歲以上兒熱結淡實不能下食方

大黃十二分　柴胡九分　黃芩　知母各十二分

升麻十分　枳實炙　杏人去尖皮熬各六分　芍藥

梔子各八分　細辛二分半　竹葉切一升

右十一味切以水六升煑取一升八合分四服十歲兒分三服以下以意消息多少量之千金有桔梗黃連無枳實杏人

小兒因食痞滿羸瘦不下食肚脹方四首

小品療四五歲兒因食及在胎中宿熱乳母飲食麤惡辛苦乳汁不起兒哺不爲肌膚心腹痞滿痿黃瘦瘠四肢痿躄繚戾服之令充悅方

芍藥十分炙今黃　黃耆　鱉甲炙　人參各四分

柴胡八分　茯苓六分　甘草炙　乾薑各二分如熱以枳實代

右八味擣篩蜜和爲丸如大豆服五丸日二服忌如常法千金有大黃無黃耆云服一九一歲以上乳服三九七歲兒服十九日二

千金療少小傷寒久病不除差復劇羸瘦骨立五味子湯方

五味子十銖　大黃六銖　芒消五分　麥門冬六分去心

石膏一兩　甘草炙　當歸　黃芩

黃連　前胡各一分

右十味切以水三升煑取一升半分服二合下利即止增減量之效

又療小兒羸瘦惙惙常服不妨乳方

甘草五兩炙

右一味擣篩蜜丸如小豆一歲兒服十九日三盡即更合並出第五卷中

劉氏療小兒肚脹漸瘦不食四肢熱不調方

甘草炙　鱉甲炙　柴胡　茯神

子芩各六分　訶黎勒皮十分　檳榔人兼皮三顆研　芍藥

橘皮各三分　生薑　當歸各四分　知母五分

大黃八分

靜嘉堂文庫所藏

右十三味切以水一升半煎取七合分爲數服得瀉病差

廣濟療小兒心腹滿喫食不下地黃飮子方

小兒食不下及不消不嗜食方四首

生地黃汁三合　生薑汁三合　訶黎勒皮四分末　白蜜一匙

右四味相和調勻分温服之微利尤良

小品療小兒宿食不消發熱九味當歸湯方

當歸　甘草炙　芍藥　人參

桂心　黃芩　乾薑各一分　大棗五枚

大黃二分

右藥切以水一升半煎取六合去滓分服增減量之

千金療少小五六日不食氣逆桂心橘皮湯方

桂心半兩　橘皮三兩　薤白切五合　黍米五合

人參半兩

右五味切以水七升先煑藥取二升次下薤米米熟湯成稍稍服之

又療少小胃氣不調不嗜食生肌肉地黃丸方

乾地黃　大黃各五分　茯苓三分　當歸

柴胡　杏人各二分去尖皮熬

右六味末之以蜜丸如麻子大服五丸日三服並出第五卷中

小兒霍亂方一十二首

廣濟療小兒霍亂心腹刺痛吐痢方

茯苓　桔梗　人參各六分　白朮五分

甘草炙　厚朴各四分炙

右六味切以水二升煑取六合去滓温服之

又療小兒霍亂嘔吐不止方

人參六分　厚朴三分炙　陳倉米三合

靜嘉堂文庫所藏

右三味切以水三升煑取七合去滓分服之

千金療小兒吐痢霍亂方

人參四分　厚朴炙　甘草各二分炙　白术三分

右四味切以水一升二合煑取五合六十日兒服一合百日兒分三服朞歲兒分再服中間隔乳服乳母忌油膩等

備急療小兒霍亂吐痢方

人參四分　厚朴炙　甘草各二分炙　乾薑一分

白术三分

右五味切以水一升煑取四合分服之

又療孩子霍亂已用有效立驗方

人參　蘆籜各二分　藊豆藤二兩　倉米一撮

右四味切以水二升煑取八合溫溫分服

又方

人參四分　生薑三分　厚朴炙　白术

甘草炙各二分

右五味切以水一升煑取四合分服中間與乳喫

又方

人參四分　木瓜一枚　倉米一撮

右三味切以水煑分服以意量之立效

必効主小兒乳霍亂方

取厠屋戸簾燒灰研以飲服一錢匕

又方

訶黎勒一枚

右一味先煎沸湯研一半許與兒服立止再服神妙

古今錄驗療小兒霍亂吐痢人參白术湯方

人參六分　白术　茯苓各四分　厚朴炙

甘草炙各三分

右五味切以水一升半煑取六合分溫服立効

劉氏療百日以來及蓐內兒霍亂方

靜嘉堂文庫所藏

以人乳半合及生薑汁少許相和煎服入口定

又療小兒霍亂方

生薑切四分　香薷一兩　薄荷一兩

右三味以水煎分溫兒與妳母俱服之甚良

小兒霍亂雜病方六首

劉氏療小兒霍亂空吐不痢方

人參六分　生薑四分　厚朴二分炙　橘皮一分

兔骨一兩炙碎

右五味切以水一升二合煎取四合服之即利下部又以杏人鹽少許皂莢末少許𪍿和硬溲如棗核大以綿裹內之便通妳母忌熱𪍿大効

又療小兒霍亂空利不吐方

烏牛葹舒移切　草一圍　生薑　人參各三兩

右三味切以甜不醋漿水一升半煎取五合分服之如孩子渴取曲蟮糞爛龍骨一兩以漿水煎澄清與兒喫即差

又療小兒霍亂不吐不痢肚脹妨滿上下不通方

甘草四分炙　當歸二分　石鹽三分

右三味切以漿水一升半煎取六合去滓牛黃麝香各半錢匕研蜜半匙相和以下灌之即通妳母與漿水粥喫勿喫𪍿肉等

又小兒乾霍渴熱及壯熱眼色慢四大困悶方

以烏豆二升淨乾擇生薑一兩切以水三升煎烏豆皮欲爛即濾取汁二合和少許蜜喫即變吐如人行六七里又與喫無問大人小兒並與服之效

又療小兒熱霍諸藥不差方

以蘆葉二大兩糯米三大合水三升先煑葉入米煑

取一升入蜜少許和服即差不足即取桑葉二升生
薑半兩切以水三升煮取一升著一匙白米爲飲服
又療小兒霍亂吐痢不止方
以人乳汁二合生薑汁粟米許荳蔻取人碎似蕎麥
大二七枚蘧蒢一小把龍骨六分以乳煎取一合著
少許牛黃麝香兎毛灰等和分爲三服如渴以糯
米汁著蜜與喫即差止
小兒吐痢方四首
千金療小兒吐痢方
以亂髮灰二分鹿角一分作末以米飲服一刀圭日三
又方
以熱牛矢汁灌之
又方
燒特豬矢水解取汁少少飲兒
劉氏療百日以下蓐内兒吐痢方

麪一錢炒　乳汁兩合　龍骨六分
右三味煎龍骨和炒麪服之即差
小兒噦方二首
備急療小兒噦方
以生薑汁五合　牛乳五合
右二味合煎取五合分二服
又方
以羊乳一升煎減半分五服無用牛乳代之
小兒口噤方四首
千金療小兒口噤方
以鹿角粉之大豆末之等分和乳塗乳飲兒
又方
以驢乳二升豬乳一升合煎得一升半服如杏人三
四服差
備急療小兒鵝口并噤方

靜嘉堂文庫所藏

礬石燒末　朱砂各半分末

右二味和研令極細傅兒舌上日三以亂髮洗舌上垢頻頻令淨即差止

古今錄驗療小兒噤其病在咽中如麻豆許令兒吐沫不能乳哺方

取水銀如黍米與服覺病無早晚水銀下咽便愈以意量之不過小麻子許與則也

小兒重舌方一十三首

千金療小兒重舌方

灸行間隨年壯穴在足大指歧中是

又方

取田中蜂房燒灰酒和薄喉下愈

又方

以竈中黃土末苦酒和塗舌上

又方

以赤小豆末和醋塗舌上

又方

取簸箕舌燒灰傅舌上

又方

黃蘗竹瀝漬取細細點舌上良

又方

見重舌舌強不能收唾燒蛇脫末以雞毛蘸醋展藥掠舌下愈

千金翼療小兒重舌方

取三屠家肉各如指大以摩舌上兒立能乳便啼

又方

以衣魚燒作灰以傅舌上（千金云衣魚塗舌上）

又方

見重舌舌強不收唾者鹿角末如小豆許著舌下數數與之

又療小兒重舌口中瘡涎出至多方

以蒲黃傅舌上不過三度愈

古今錄驗療兒重舌欲死方

灸右足踝三壯立愈又灸左右並良（千金云灸兩足外踝）

又方

取亂髮燒灰末傅舌上甚佳

靜嘉堂文庫所藏

小兒鵝口鷰口方六首

千金療小兒心藏熱口爲生瘡重舌鵝口方

取柘根剉五升無根只以弓材佳

右一味以水一斗煑取二升以汁更煎取五合細細傅拭齒數數爲之良

又方

口生瘡白漫漫取桑木汁先以父髪拭口次以桑汁塗之

又療小兒鵝口不能飲乳方

取白鵝屎汁瀝口中良

又方

取黍米汁塗之

又方

取父母亂髪淨洗纏桃枝沾取井華水東向日以髪拭口中得口中白乳以置水中七過瀝洗三朝作之

救急療小兒鷰口兩吻生瘡方

取髪灰以豬脂和塗之千金同

小兒口瘡方五首

小品療小兒口爛瘡方

取羊乳細細瀝口中不過三度差

千金療小兒口瘡方

大青三分　黃連二分

右二味切以水三升煑取一升二合一服一合日再夜一

文仲支太醫療小兒口瘡方

桑木白汁　生地黃汁各一合　赤蜜半合

右三味和煖傅兒口中瘡便差

救急療小兒口瘡方

以蛇脱皮水漬令濕軟拭口內瘡一兩遍即差

劉氏療小兒口瘡方

靜嘉堂文庫所藏

黃蘗皮切一兩 烏豆一升

右二味以水二升煑取兩合去滓重煎如餳入少許龍腦香研和傅之甚良

小兒口中涎出方三首

千金療小兒口涎出方

以白羊屎内口中差止

又方

以東行牛口中沫塗兒口中及頤上

又方

桑白汁塗之差

小兒舌上瘡脣腫方五首

小品療小兒脣腫及口赤生白瘡爛方

清旦研桑木白皮取汁以塗兒脣口即差

又小兒舌上瘡方

烏賊魚骨燒末以雞子黃和塗之至喉咽舌下遍傅即差止

千金療小兒舌瘡方

烽房燒灰屋間塵各等分和先洗瘡使乾傅之效

又方

羊蹄骨中生髓和胡粉傅上日三取差

又舌腫強滿口方

滿口含糖醋少時熱氣通愈

小兒咽喉生瘡方二首

千金療熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入者膏方

當歸 射干 升麻各一兩 附子半兩

白蜜四合

右五味切以豬膏四兩先煎之令成膏下著地勿令大熱内諸藥微火煎令附子色黃藥成去滓投蜜更上火一兩沸以器盛之取杏人許含之日四五咽之無妨大人小兒並用妙

靜嘉堂文庫所藏

又療口中瘡咽喉塞不利口燥膏方

豬脂一斤　黃連一兩　白蜜一升

右三味合煎令成膏去滓含半棗大日四五夜亦含之

小兒喉痺方四首

千金升麻湯主小兒喉痺痛若毒氣盛便咽塞并大人喉咽不利方

生薑　升麻　射干各二兩　橘皮一兩

右四味切以水六升煎取二升分溫三服

又療小兒卒毒腫著喉頸壯熱妨乳方

升麻　射干　大黃各一兩

右三味切以水二升半煮取八合一歲兒分三服餘滓傅腫處冷更煖而薄大兒以意加之

又方

煮桃皮汁三升服之又燒荊瀝汁服之

劉氏療小兒喉痺熱塞方

升麻五兩切　馬蘭子一合

右二味以水一升煎取二合入少白蜜與兒服之甚良

小兒聤耳方四首

千金療小兒聤耳方

末石硫黃以粉耳中日一夜一差止

又療少小聤耳方

桃人熟末以鼓許裹塞耳中

古今錄驗小兒聤耳方

青羊屎暴乾以綿裹塞中即差

又小兒聤耳有瘡及惡肉耳中雄黃散方

白麻措取皮一合　花燕脂十顆

右二味擣篩細研傅耳中令滿一兩度差止（方中無雄黃未詳其名）

靜嘉堂文庫所藏

小兒鼻塞方四首

千金療小兒鼻塞不通足涕出方

杏人二分 椒汗出 附子去皮 細辛各一分

右四味切以醋五合漬藥一宿明旦以豬脂五合煎令附子色黃膏成去滓待冷塗絮導鼻孔中日再兼摩頂上

又療小兒鼻塞生息肉方

通草 細辛各一兩

右二味擣篩以綿纏如棗核大藥如豆著綿頭著鼻孔中日二

古今錄驗療小兒鼻塞不通細辛膏方

細辛 通草各一分 辛夷人一分半 杏人二分去皮

右四味切以羊髓三合豬脂三合緩火煎之膏成絞去滓取二米粒許大以內鼻孔中頻易佳

劉氏療小兒鼻塞不通嗅乳不得方

醍醐三合 青木香 零陵香各四分

右三味切和前成膏取少許以膏和撚為丸或以膏塗兒頭上及塞鼻中以通佳

外臺秘要方卷第三十五

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔 校勘

靜嘉堂文庫所藏

外臺祕要方卷第三十六 小兒諸疾下五十門

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

小兒中風方四首

小兒欬嗽方八首

小兒欬逆上氣方七首

小兒傷寒方三首

小兒天行方八首

小兒諸黃方四首

小兒諸癨方九首

小兒眼赤痛方八首

小兒諸淋方六首

小兒小便不通方五首

小兒遺尿失禁方五首

靜嘉堂文庫所藏

小兒大便有血方三首
小兒大便不通方四首
小兒赤白痢方七首
小兒蠱毒血痢方九首
小兒熱渴痢方四首
小兒疳痢方七首
小兒无辜疳痢方三首
小兒諸雜痢方四首
小兒忽衄血方六首
小兒齒不生方二首
小兒頭熱盜汗方三首
小兒顖開不合方四首
小兒解顱方二首
小兒月蝕耳瘡方三首
小兒臍中汁出并瘡腫方一十一首
小兒癰腫方二首
小兒丹毒方七首
小兒禿瘡方七首
小兒頭瘡方三首
小兒頭面熱瘡方七首
小兒瘰癧方二首
小兒侵淫瘡方三首
小兒蠼螋瘡方二首
小兒惡瘡方五首
小兒火灼瘡方二首
小兒風瘙癮疹方五首

靜嘉堂文庫所藏

小兒疝氣陰㿗方八首

小兒陰瘡及腫方八首

小兒脫肛方六首

小兒䘌蟲蝕下部方四首

小兒疳濕瘡方六首

小兒蚘蟲方七首

小兒蟯蟲及寸白方五首

小兒瘻瘡方四首

小兒癠瘡方六首

小兒癬瘡方六首

小兒誤吞物方四首

小兒雜療方六首

小兒中風方四首

千金療少小中風手足拘急二物石膏湯方

石膏（雞子許一枚碎綿裹） 眞珠（一兩研）

右藥以水二升煑取五六沸內眞珠煑取一升去滓稍稍分服之

又療少小中風脉浮發熱自汗出項彊鼻鳴乾嘔方

甘草（炙） 芍藥 桂心 生薑（各一兩）

大棗（四枚擘）

右五味切以水三升煑取一升去滓分溫三服忌如常法（此張仲景桂枝湯但劑分小爾）

又療少小新生中風二物驢毛散方

驢毛（取背交脊上會中毛拔取如手大拇指一把是髻頭毛也） 生麝香（如大豆二枚研）

右藥以乳汁和於銅器中微火上煎令焦熟出研末之小兒不能飲以乳汁和之於葦竹筒中盛寫入咽中然後飲乳汁令入腹

又療少小新生肌膚幼弱喜爲風邪所中身體壯熱或中大風手足

驚掣五物甘草等生摩膏方

甘草 防風各一兩 白朮 桔梗各二十銖

雷丸二兩半

右藥切以不中水猪脂一斤煎熟取成膏合諸藥於微火上煎之消息視之凝膏成去滓取如彈丸大一枚炙手以摩兒百過寒者更熱熱者更寒小兒雖無病常以少膏摩顖上及手足心甚辟風寒良翼同並出第五卷中

小兒欬嗽方八首

小品療少小欬嗽腹脹七物小五味子湯方

五味子碎 紫菀各二分 黃芩 甘草炙

麻黃去節 生薑 桂心各一分

右藥㕮咀以水一升煮取七合分五服忌如常法

又療少小欬嗽晝差夜甚初不得息不能復啼四物欵冬丸方

欵冬花 紫菀各一兩半 伏龍肝一分 桂心二分

右藥擣篩蜜和如泥取如棗核大塗乳頭令兒飲之日三千金同

又療少小十日以上至五十日卒得暴欬吐乳嘔逆晝夜不得息四物湯方

桔梗 紫菀各三分 甘草一分炙 麥門冬七分去心

右藥切以水一升煮取六合去滓分五服以差爲度千金有桂心無桔梗以水二升煮取一升以綿著湯中捉綿滴兒口中晝夜四五過節哺乳

又療小兒中冷及傷寒暴欬嗽或上氣咽喉鳴氣逆者或惡寒鼻塞清水出紫菀湯方

紫菀 杏人去皮尖 甘草炙 黃芩

麻黃去節 橘皮 桂心 青木香

當歸各一兩 大黃三分

右十味切以水三升煮取九合去滓一歲以上至五歲見以意

靜嘉堂文庫所藏

量之分服千金云見六十餘日至百日一服二合半百餘日至二百日一服三合餘同

千金療少小欬嗽八物生薑煎方

生薑七兩　乾薑四兩　桂心二兩　甘草三兩

杏人一升去尖皮熬　欵冬花　紫菀各三兩　蜜一升

右藥末之以蜜微火上合諸藥煎之使如飴餔量其大小多少與兒含咽之百日小兒含如棗核許日四五甚良有驗出第五卷中

備急療少小欬嗽上氣杏人湯方

麻黃八分去節　杏人四十枚去尖皮

右二味切以水一升煑取七合去滓分服百日小兒患熱氣急不得服小便赤黃服之甚良大人孩童以意量之與服忌如常法

又療少小欬嗽方

紫菀六分　貝母三分　欵冬花一分

右三味擣爲散取豆許著乳頭令兒飲之日三㚻母忌如常法

劉氏療小兒欬嗽不得卧方

甘草六分炙　桔梗四分　桑白皮　貝母

茯苓各三分　大青　吳藍　五味子

人參各二分

右九味切以水二升煑取八合去滓量多少大小與服忌如常法

千金杏人丸主大人小兒欬逆上氣方

小兒欬逆上氣方七首

杏人三升去尖皮雙人熬令黃黑

右一味熟擣如膏蜜一升分爲三分以一分内杏人擣令彊更内一分擣之如膏又内一分擣熟止先食含之咽汁量其多少日三每可半方寸不得過也

靜嘉堂文庫所藏

又射干湯主小兒欬逆喘息如水雞聲方

射干（二兩） 麻黃（去節） 紫菀 甘草（炙）

生薑（各一兩） 桂心（五寸） 半夏（五枚洗） 大棗（二十枚去核）

右八味切以水七升煮取一升半內蜜五合去滓分溫服二合忌餳羊肉生葱

又方

半夏（四兩洗） 生薑（三兩） 桂心 紫菀

細辛 阿膠（各二兩） 甘草（二兩炙） 款冬花（二合）

蜜（一合）

右九味切以水一斗先煮半夏取六升去滓內諸藥煮取二升五合去滓兩歲兒飲六合五歲兒飲一升量大小多少加減之

又五味湯主小兒風冷入肺上氣氣逆面青喘迫晝夜不息食則不止方

五味子（二分） 麻黃（去節一分） 當歸（二分） 人參（一分）

細辛（半分） 乾薑（一分） 桂心（一分） 紫菀（一分）

款冬花（半分） 甘草（一分炙） 大黃（六分）

右十一味切以水二升半煮取九合去滓兒六十日至百日服二合半百日餘至二百日一服三合出第五卷中（一方無款冬大黃有大棗三枚）

千金翼療小兒寒熱欬逆膈中有澼乳若吐不欲食方

乾地黃（四兩） 麥門冬（半升去心） 五味子（五合） 大黃

消石（各一兩） 蜜（半升）

右六味切以水三升煮取一升去滓內消石蜜煮令沸服二合日三胷中當有宿乳一升許出兒大者服五合

又療小兒大人欬逆短氣胷中吸吸呵出涕唾嗽出臭膿方

燒淡竹瀝煮二十沸一服一合日五服大人服一升不妨食息乳哺並出第十一卷中

靜嘉堂文庫所藏

劉氏療小兒上氣急滿坐卧不得方

鱉甲一兩炙令極熟擣爲末　燈心一握

右二味以水二升煎取八合以意量之與服

小兒傷寒方三首

千金論曰夫小兒未能冒涉霜雪乃不病傷寒也大人解脫之久傷於寒冷則不論耳然天行非節之氣其亦得之有時行疾疫之年小兒出腹便患斑者也治其時行節度故如大人法但用藥分劑少異藥小冷耳

又療小兒傷寒方

生葛汁　淡竹瀝各六分

右二味相和二三歲兒分三服斟酌服不宜煮生服佳

又療少小未滿百日傷寒鼻衄身熱嘔逆麥門冬湯方

麥門冬三分　桂心八銖　寒水石　石膏碎　甘草炙各二分

右五味切以水二升半煮取一升分服一合日三

又療少小傷寒芍藥四物解肌湯方

芍藥　黃芩　升麻　葛根各二分

右藥切以水二升煮取九合去滓分四服朞歲以上分三服

並出第五卷中

小兒天行方八首

廣濟療小兒天行壯熱欬嗽心腹脹妨方

人參　甘草炙各二分　生地黃　麥門冬去心　茅根各六分

右五味切以水二升煮取七合去滓以意量之分溫與服忌如常法

又方

麥門冬去心　茅根各六分　甘草炙　人參各二分

紫菀　升麻　貝母　竹瀝各三分

靜嘉堂文庫所藏

右八味切以水二升煮取八合分服忌如常法
千金療少小有熱不汗二味通汗散方
雷丸四兩 粉半斤
右藥擣篩以粉兒身以差爲度
又療小兒生一月至五月乍寒乍熱方
細剉柳枝煮取汁以洗兒立效若渴絞冬瓜汁服之
又療小兒寒熱及赤氣中人豬蹄散方
取豬後腳懸蹄燒灰末以乳汁飲一撮立效並出第
五卷中
劉氏療小兒天行頭痛壯熱方
青木香六分 白檀香三分
右二味擣散以清水和服之以水調塗頂頭痛立差
又方
吳藍 大青各十分 甘草炙 生麥門冬去心
生薑各六分 茵蔯三分 梔子人十顆 蘆根洗一握
右八味切以水二升煮取九合分溫服之忌如常法
又療小兒天行五日以後熱不歇方
棗葉一握 麻黃一兩去節 葱白一合切 豉一合
右四味切以童子小便二升煎取九合去滓分服之
小兒諸黃方四首
千金療小兒黃方
擣土瓜根汁澄清滴兒鼻中如大豆許又服三合
又方
擣麥青汁服之
又方
擣韭根汁以滴兒鼻中少許即出黃水差
又療諸黃方
小豆二十一枚 瓜蔕十四枚 糯米四十顆

靜嘉堂文庫所藏

右三味擣散吹鼻中差並出第五卷中

小兒諸瘧方九首

廣濟療小兒瘧方

取蛇皮燒灰一錢匕和冷水服之

又方

取驢軸下垢膩刮取和麪作燒餅與喫以差止

刪繁療小兒瘧或自能飲或不能飲毋含藥與飲之常山酒煎方

常山二兩　桂心一兩　甘草半兩

右三味切以酒一升煎取七合去滓分服取吐差止

千金常山湯主小兒溫瘧方

常山四分切　淡竹葉一握切　小麥三合

右三味以水一升半煮取五合一日至七日兒一合爲三服八日至十五日兒一合半爲三服十六日至二十日兒二合爲三服四十日至六十日兒六合爲三服六十日至百日兒一服二合半百日至二百日兒一服三合其一歲至七八歲兒增藥水並以此爲率

又方　灸兩乳下一指各三壯

又方　燒雞肶胵黃皮末和乳與服男雄女雌

又方　生鹿角末發時與一錢匕服之

又方　燒鼈甲灰以酒服一錢匕至發時服三匕并以火灸身並出第五卷中

劉氏療小兒瘧方

黃丹半錢匕以蜜水和與服若冷以酒和與服之良

小兒眼赤痛方八首

古今錄驗療小兒眼痛方

取淡竹瀝拭之

又方　取鯉魚膽傅之

靜嘉堂文庫所藏

又方　取車前草汁和竹瀝傅之
又方　以人乳浸黃連點之
劉氏療小兒赤眼方
黃連三分　朴消一分熬令盡
右二味以婦人㛐汁浸之點眼良
小品療小兒蓐內赤眼方
生地黃薄切冷水浸以貼之妙
又方　取羊子肝薄切以井花水浸以貼之妙
又方　取黃蘗以乳浸點之
小兒諸淋方六首
千金療小兒淋方
車前子一升水二升煮取一升分服之一方用車前草
又方　以冬葵子煮汁服之

又方　取蜂房亂髮燒灰末以水服一錢匕日再服
文仲療小兒淋兼石淋方
取特牛陰毛燒灰末以漿水服一刀圭日再服
又方　榆皮　瞿麥各六分
右二味切以水一升煮取半升去滓分溫服之
又方　小麥一合　葱白一握
右二味以水一升煮去滓取一半分服之
小兒小便不通方五首
廣濟療小兒熱極病小便赤澀或不通尿輒大啼呼滑石湯方
滑石十六分　子芩十四分　冬葵子八分　車前草切一升
右四味以水二升煮取一升一歲至四五歲服一合日再服甚良
小品療小兒小便不通地膚子湯方
地膚子一分　瞿麥　冬葵子各二分　知母

靜嘉堂文庫所藏

黃芩　豬苓　海藻　橘皮
升麻　通草各一分半　大黃八分
右十一味切以水二升煮取一升大小多少量與服忌如常法
千金有枳實無橘皮
千金療小兒小便不通方
車前草切一升　小麥一升
右二味以水二升煮取一升二合去滓以煑粥服日三四量與服
又方
冬葵子一升
右一味以水二升煮取一升入滑石末一分溫分服
劉氏療小兒忽不得小便急悶方
葱白一握　通草一兩　冬葵子一合
右三味切以水二升煮取一升去滓量服
小兒遺尿失禁方五首
千金療小兒遺尿方
瞿麥　龍膽　石韋去毛　桂心
皂莢炙去皮子各二分　雞腸草四分　車前子五分　人參一兩
右八味擣篩蜜丸如小豆每服五丸加至六七丸翼中又有雞腸草十二分
又方
灸臍下一寸半隨年壯
又方
灸大敦三壯
又方
小豆葉擣汁服佳
又療失禁不覺尿出方
以豆醬和竈突黑如大豆許內尿孔中佳
小兒大便有血方三首
救急療小兒大便並血出方
鼈甲一枚炙末五分
右一味以水和量多少大小服日三忌如常法千金云鼈頭一枚

靜嘉堂文庫所藏

又方　以車釭一枚燒令赤內水中與服差千金同
又方　燒甑帶灰塗乳上與飲之差千金同
小兒大便不通方四首
千金紫雙丸生小兒身熱頭痛食飲不消腹脹滿或小腹絞痛
大小便不利或重下數起小兒無異疾唯飲食過度不知自止
哺乳失節或驚悸寒熱唯此丸治之不差復可再服小兒欲
下是其蒸候哺食減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調悉
宜用此丸不用佗藥數用神驗千金不傳方
巴豆去心皮熬　蕤核人各十八銖別擣　麥門冬十銖去心　甘草五銖炙
甘遂二銖　真珠二銖　牡蠣熬　臘各八銖
右八味以湯熟洗巴豆研以新布絞去油別擣甘遂甘草牡
蠣麥門冬細篩畢擣巴豆蕤人令極熟乃內諸藥散更擣三
千杵如藥燥入少蜜足之半歲兒可服如荏子一雙一二歲
兒服如半麻子作一雙三歲兒服如麻子一枚作一雙四歲
兒服如麻子二丸五六歲兒服如大麻子二丸七八歲兒服
如小豆二丸九歲十歲兒微大於小豆二丸常以雞鳴時服
至日出時不下者飲熱粥汁數合即下丸皆雙出也下甚者
飲冷粥止之
必効療小兒大便不通方
灸口兩吻各一壯
又方
豬苓一兩
右一味以水少許煑雞矢白一錢匕與服立差
又主小兒大小便不通妨悶方
白蜜一合
右一味以鎗中煎爲丸內下部中即通小便不通嚼生葱以
綿裹少許內小便道中即通

靜嘉堂文庫所藏

小兒赤白痢方七首

廣濟療小兒赤白痢腹痛方

赤石脂　龍骨　地榆　黃連（各四分）

厚朴（炙）　人參（各三分）　當歸　乾薑（各二分）

右八味擣散以飲汁服半錢匕日再服之蜜丸以乳汁下三丸至七丸亦佳此方甚妙以意量之

又療小兒客咳白痢方

人參（六分）　厚朴（炙）　甘草（炙各四分）　茯苓

桔梗（各五分）　梁州欅皮（八分炙）

右六味切以水三升煑取一升量其大小可一合爲度以差止忌如常法

救急療二百日小兒赤白痢日夜五十行方

白朮　乾薑（各三分）　茯苓　甘草（炙各四分）

附子（炮二分）

右五味切以水三升煑取一升分溫服之

必効療小兒一歲以上二歲以下赤白痢久不差雞子餅方

雞子（二枚取白）　胡粉（兩錢熬）　臘（一棗許）

右三味於鐺中熬令消下雞子胡粉候成餅平明空腹與喫可三頓痢止

劉氏療小兒赤白痢方

油麻子（一抄許炒令香）

右一味擣末以蜜作漿調與服大人亦療之

又療小兒赤白痢咽脹不出方

黃蘗（半兩炙）　當歸（六分）

右二味切以水一升煑取六合分溫服之佳

又方

靜嘉堂文庫所藏

莨菪子　羊肉薄切布上

右二味以綿裹內下部中不過再差量之可用甚妙

小兒蠱毒血痢方九首

廣濟療小兒熱毒膿血痢方

羚羊角　地榆　阿膠　赤石脂

黃連　當歸各八分　吳藍　蒨根

甘草炙各六分　黃芩五分

右十味切以水六升煮取二升半量大小服之甚妙

又療小兒熱毒血痢方

犀角十分　地榆六分　蜜三分　地麥草五合

右四味切以水三升煮取二升去滓量大小服之

又方

葱白三兩　香豉三合　梔子七枚綿裹　黃連一兩

右四味切以水二升煮取九合去滓分服

又療下鮮血方

取梔子人燒灰末水和一錢匕服之量其大小加減服之

小品療少小熱痢不止梔子丸方

梔子人七枚　黃連五分　黃蘗三分炙　礬石四分燒

大棗四枚炙令黑

右五味末之以蜜丸空腹服小豆許七丸差如未除更服忌如常法

古今錄驗療小兒熱痢子芩湯方

子芩十二分　知母　女萎各六分　竹葉八分切

黃蘗　甘草炙各四分

右六味切以水二升煮取一升分服甚妙

又療小兒痢血犀角樺皮煎方

梁州樺皮二十分炙切　犀角十二分屑

靜嘉堂文庫所藏

右二味以水三升煑取一升量大小服之神良崔氏同

又療小兒蠱毒痢血蘘荷湯方

蘘荷根　犀角屑　地楡　桔梗各二分

右四味切以水二升煑取九合去滓服一合至再服

劉氏療小兒血痢方

地楡　黃蘗　黃連　黃芩各六分

馬藺子二分　蒨根一兩　生薑三分

右七味切以水二升煑取一升分服大小量與之一合至二合爲度

小兒熱渴痢方四首

小品療少小壯熱渴痢八味龍骨散方

龍骨研　甘草炙　赤石脂　寒水石

大黃　石膏　桂心　栝樓各三分

右藥擣散以水及酒五合煑散二合量大小分服之効

又療少小夏月藥大下後胃中虛熱渴唯可飮麥門冬湯方

麥門冬去心　甘草炙各四分　枳實炙　黃芩

人參各三分　龍骨六分

右六味切以水二升煑取九合去滓分溫服

古今錄驗療小兒渴痢欅皮飮子方

梁州欅皮十二分　栝樓　茯苓各八分　人參六分

粟米二合

右五味切以水三升煑取一升二合去滓分服量大小與服之

劉氏療小兒痢渴不徹肚脹不能食方

訶梨勒皮六分　桑葉十分炙末

右二味切以水一升煑取五合去滓分服之亦治大人

小兒疳痢方七首

廣濟療老小一切痢久成疳方

白龍骨六分　黃連　白石脂　雞矢白熬

胡粉熬　茯苓　阿膠各四分炙

右七味擣篩蜜丸以飲汁下五丸漸加至七丸十丸大小增減服之雞矢一作雞屎礬

又療小兒疳痢渴瘦方

取椿木根乾末之　粟米擣粉煑飲汁

右二味以蜜和作丸服五丸至七丸十丸以差爲度崔氏同

又療大人小兒久痢成疳方

豉三升　葱白一握　桃葉一握　鹽二十顆

苦參五寸　青黛一抄

右六味切以水三升煑取一升二合去滓仰卧灌下部中極妙

又療小兒疳痢困垂死方

益母草

右一味煑食之取足差止甚妙崔氏同

劉氏療小兒痢大部開并有𤺋疳痢經四五日吹藥止痢療疳神驗方

黃連二分擣末　麝香少許研

右二味相和以竹筒吹大部中三兩度差止

又療小兒疳痢三歲以上口裏有𤺋身壯熱及手足心煩大便處極臭即是疳痢宜用方

黃連　黃蘗　地榆炙　白頭翁

高良薑　酸石榴皮　生薑　當歸各二分

白朮一分　龍骨四分

右十味切以水二升煑取八合分服大小量之其口中𤺋以盧會末赤地麥擣末相和塗之下部末蚺蛇膽黃連麝香

靜嘉堂文庫所藏

擣傳之兼以竹筒吹少許內下部中差止亦主小兒疥瘡

必效療小兒久痢無問冷熱疳痢悉主之方

棗（一枚去核勿令皮破內胡粉令滿）

右二味於炭火中燒令如炭於瓷器中研之以米飲和分服之一歲以下分服之不過三顆差王郎中處得之此方傳用甚妙

小兒无辜疳痢方三首

備急療小兒无辜疳痢方

龍骨 當歸 黃連 人參

墨食子 甘草（炙各一兩）

右六味擣散蜜丸服三丸日再以差爲度大小增減量之

救急療小兒瘦頭乾无辜兼痢方

馬齒莧

右一味擣絞汁服三合以差止

劉氏療孩子頭乾肚中有无辜者益腦散方

地榆（六分） 蝸牛（十二分熬） 青黛（三合） 麝香

人糞（燒灰） 蘭香根（燒灰） 蚺蛇膽（各一分） 龍腦香（兩豆許）

右八味擣散以飲下半錢匕量大小與服之忌如常法

小兒諸雜痢方四首

劉氏療小兒膿痢直從春至秋冬以來不差者方

薤白（切一合） 生薑 蕪荑（各一分） 子芩

黃蘗 阿膠 芍藥 厚朴（炙）

人參（各二分） 地榆 當歸（各三分） 香豉（一合綿裹）

右十二味切以煮鍛水重濾者一升半煮取九合分服以差爲度秋末冬末加赤石脂半兩乾薑一分白朮二分大小量之忌如常法

又療小兒痢後虛手足心熱痢縱未斷亦可服之方

靜嘉堂文庫所藏

橘皮　生薑各三分

右二味切以牛乳半升煎取四合去滓分温服之

又療小兒水痢不止方

厚朴炙　黃連各一兩

右二味切以水一升煎取六合分服雜痢此方並治之

又療小兒曩痢方

甘草炙　茯苓各六分　人參二　黃連各四分

厚朴炙　生薑各二分　龍骨八分

右七味切以水一升煎取三合欲臥先取鹽麪麝香爲小丸内下部中然服此飲分服甚妙忌如常法

小兒衄血方六首

深師療少小衄血方

桂心十八銖　亂髮燒灰　乾薑各六銖

右三味擣篩爲散服方寸匕日再

又方

燒桑耳令焦

右一味擣散以内於鼻孔中爲丸以内亦得

小品療少小未滿百日傷寒身熱衄嘔逆五味麥門冬湯方

麥門冬去心　石膏　寒水石各三分　甘草炙二分　桂心一分

右藥切以水二升煑取八合分服効

古今錄驗療小兒鼻衄不止方

以馬矢綿裹塞鼻孔中

又方

燒髮灰末吹鼻孔中亦佳

又方

單服白馬屎汁三合甚良

小兒齒不生方二首

小品療少小齒落不生方

取牛屎中大豆二七枚小開頭皮小許以次注齒根

靜嘉堂文庫所藏

數度即當生千金同

又方

取雌鼠屎二七枚以一枚拭齒根處盡此止二十一日齒當生雌鼠屎頭尖是也千金同

小兒頭汗及盜汗方三首

千金療少小頭汗二味茯苓粉散方

茯苓　牡蠣（各四兩熬）

右藥以粉八兩合治下篩有熱輒以粉頭汗即自止

又此由心藏熱之所感宜服犀角飲子方

犀角（三分）　茯神（四分）　麥門冬（六分）　甘草（二分炙）　白朮（一分）

右五味切以水九合煎取四合分再服即定又加龍齒四分佳

延年療小兒盜汗方

麻黃根　雷丸　牡蠣（各三兩熬）　甘草（二兩炙）

乾薑（一兩）　粱米（一升）

右六味擣粉以粉身汗即止

小兒顖開不合方四首

廣濟療小兒顖開不合方

防風（六分）　白及　栢子人（各四分）

右三味擣末以乳汁和塗顖上以合爲度千金同

范汪療少小腦長頭大顖開不合臂脛小不能勝頭三歲不合熨藥方

半夏　芎藭（各一升）　細辛（二兩）　桂心（三尺）　烏頭（十枚）

右五味切以淳酒四升漬之晬時溫之以絮熨兒顖門上朝暮各二三二十日自彊急（千金桂一尺又有生薑一升）

千金療小兒顖陷方

灸臍上下各半寸及鳩尾骨端又足太陰各一壯

又方

取猪牙車骨煎取髓塗顖上愈生用亦得

靜嘉堂文庫所藏

小兒解顱方二首

千金療小兒解顱方

蛇蜕皮熬末

右一味和猪頰車骨中髓以塗顱上日三

又療小兒解顱三味細辛傅藥方

細辛 桂心各一分 乾薑三分

右藥擣散以乳汁和塗於顱上乾復塗見面赤即愈

小兒月蝕耳瘡方三首

集驗療小兒頭瘡月蝕口邊肥瘡蝸瘡悉差黃連胡粉膏散方

黃連二兩 胡粉 水銀各一兩研入

右三味擣爲散相和水銀研令相得以傅瘡上縱黃汁引成瘡亦以粉之即差一方有白礬一兩燒蛇床子一兩末入用亦甚妙至耳邊到項上並用

又療小兒耳瘡方

燒馬骨灰粉以傅之

又方

傅雞屎白佳

小兒臍汁出并瘡腫方一十一首

廣濟療小兒臍汁出不止兼赤腫白石脂散方

以白石脂一兩研成粉熬令溫以粉臍瘡甚良千金同

備急療小兒臍中生瘡方

以桑汁塗乳上使兒就飲之千金同

又方

取羖羊乳飲兒千金同

又方

取東壁土末以傅之甚良千金云若汁不止燒蒼耳子粉之

又方

燒甑帶灰和膏傅之千金同

又兒生過月臍汁出方

燒絳灰傅臍中千金同

靜嘉堂文庫所藏

又兒臍赤腫方

杏人（二分熬令紫色）　猪牙車骨中髓

右二味先研杏人入此髓和令調以塗臍上千金同

古今録驗療小兒風臍汁出甘草散方

甘草（炙）　螻蛄（熬合三分）

右二味擣散以安臍中差止甚妙

又療小兒臍中汁不差黄蘗黒散方

黄蘗（炙一兩）　釜底墨（四分）

右二味擣和作散以粉臍中即差

又療小兒臍著濕爛鹽豉熨方

鹽　豉（等分）

右二味擣作餅如錢許安新瓦上炙令熱用熨臍上差止

亦用黄蘗末以粉之妙

劉氏療小兒初生至七日者臍欲落封藥方

雄鼠屎（七顆）　乾薑（棗許大）　胡粉（三分熬）　麝香（少許）

緋帛灰

右五味擣研為粉看臍欲落不落即取藥以傅之是以不令風入故也著乾薑恐漏不著亦得

小兒癰腫方二首

千金漏蘆湯主小兒熱毒癰疽赤白諸丹毒熱瘡癤方

漏蘆（一分用葉）　升麻（一分半）　連翹（一分）　白斂（一分）

甘草（炙一分）　芒消（一分）　枳實（炙一分半）　麻黄（去節一分半）

黄芩（一分半）　大黄（四分）

右十味以水一升煑取五合兒生一日以上至七日取一合分三服生八日至十五日取一合半分三服生十六日至二十日取二合分三服生二十餘日至三十日取三合分三服

靜嘉堂文庫所藏

又五香連翹湯主小兒風熱青腫腫色白或有惡核瘰癧附骨癰疽節解不舉白丹走遍身中白㾦搔不已方

青木香　薰陸香　沈香　雞舌香

黃芩　麻黃去節各一分　連翹　海藻

射干　升麻　枳實炙各一分　麝香半分研

大黃八分　竹瀝三合

右十四味切以水四升煑取二升內竹瀝煑取一升二合兒生百餘日至二百日一服三合生二百日至朞歲一服五合一方不用麻黃

小兒丹毒方七首

廣濟療小兒丹毒方

青藍汁五合　竹瀝七合

右二味相和分爲二三服大小量之一合至三合

千金療小兒數十種丹皆主之搨湯方

大黃　甘草炙　當歸　芎藭

白芷　青木香　獨活　黃芩

芍藥　升麻　沈香　木蘭皮各一兩

芒消三兩

右十三味切以水一斗二升煑取三升去滓內消以綿搵湯以搨之乾則易之取差止

又療小兒溺竈丹初從兩股及臍間起走入陰頭皆赤方

以水一升煑桑根皮取一升以洗浴之

救急療小兒赤丹一名丹溜方

取小豆擣末以雞子白和塗之以差爲度先以鈹決丹上然傅之千金亦療火丹

古今錄驗療月內兒發丹方

升麻　黃芩　犀角　大黃別浸　柴胡各二分

靜嘉堂文庫所藏

甘草一分炙 石膏三分 藍葉切三合 梔子八分
右九味切以水一升二合煑取八合下竹瀝四合更煎取一半去
滓分二服甚妙
又療小兒丹毒方
取愼火草擣以封之差止
又方
擣藍汁塗之又藍澱塗之妙

小兒秃瘡方七首
千金療小兒頭上秃瘡方
取雄雞屎白陳醬汁苦酒和以洗瘡傅之日一度
又方
取不中水蕪菁葉燒灰和猪脂傅之
千金翼療小兒秃瘡無髮苦癢方
野葛末一兩 猪脂 羊脂各一合
右三味合煎令消待冷以傅之不過三上千金同
備急療若頭生瘡白秃不生髮有汁出或無汁乾燥痛方
煑雞子七枚剥去白
右一味取黄於銅器中急火熬乾末以傅之取差爲度
又方
取春秋桃葉心無問多少擣汁塗之千金并翼治小兒頭不生髮取楸葉擣汁以傅頭上立生
又方
燒鯽魚末以醬汁和塗之上同
又方
取臘月猪屎乾末以傅之差爲度

小兒頭瘡方三首
千金療小兒頭瘡方
胡粉一兩 黄連二兩
右二味爲末先洗瘡去痂拭乾傅之即愈更發如前傅之
又方 胡粉二兩 白松脂三兩 水銀一兩研 猪脂四兩
右四味合煎去滓内胡粉水銀攪令和調傅之大人同翼同

靜嘉堂文庫所藏

救急療小兒頭瘡經年不差差而復發方

雄黃(研) 大黃 黃蘗 黃芩 薑黃

雌黃(研) 白芷 當歸 青木香(各四分)

右九味切㕮咀以苦酒浸一宿以猪脂一大升煎候白芷色黃膏成去滓入水銀一兩以唾於手中研令消入膏攪相得於甆器中收每以皂莢湯洗瘡乾拭以膏塗之日夜再換以差爲度

小兒頭面瘡方七首

廣濟療小兒頭面生熱瘡方

黃連 蛇床子 黃蘗(各八分) 胡粉(四合)

右四味擣散以麻油和塗瘡遍傅之佳

千金療三日小兒頭面瘡起身大熱方

升麻 柴胡 石膏(各一兩) 大黃

甘草(二兩) 當歸(二兩)

右七味切以水三斗煮取一斗去滓以浴小兒瘡上訖傅黃連散

又療小兒身體頭面悉生瘡方

榆白皮(乾者多少任用)

右一味擣末以醋和塗之綿覆上蟲出立差亦可以猪脂和塗之

千金翼苦參湯主小兒頭面熱瘡方

苦參(八兩) 黃芩(二兩) 大黃 芍藥

黃連(各二兩) 蛇床子(一升) 黃蘗(五兩) 菝葜(一斤洗)

右八味切以水二斗煎取一斗以洗浴兒日三即差(千金一云治上下徧身生瘡)

又方

石南草 大黃 黃芩 黃蘗

礬石 澤蘭(各一兩) 戎鹽(二兩真者) 蛇床子(三合)

右八味切以水七升煮取三升以絮內湯中洗拭兒日三度差

備急療小兒三歲患頭上起熛漿如釘蓋一二日及肯背皆生

靜嘉堂文庫所藏

仍成瘡方
水銀　朱砂各半兩破兩相得　石硫黃一兩研　臘月猪脂和研如膏
右四味煑桑葉湯洗以傳之勿令豬犬婦人小兒等見之無效
古今錄驗療小兒頭瘡面上亦有日月益甚者方
黃連　赤小豆各等分
右二味擣末以臘月豬脂和塗之即差止
小兒瘰癧方二首
千金連翹丸主小兒无辜寒熱彊健如故而身體項頸結核瘰
癧及心脅腹背裏有堅不痛名爲結風氣腫方
海藻三分洗　連翹　桑白皮　牡丹
白頭翁　防風　黃蘗　桂心
香豉　獨活　秦艽各四分
右十一味擣篩蜜丸如小豆三歲以飲服五丸至十丸五歲

以上以意加之
必効療小兒項上瘰癧方
以榆白皮爛擣如泥封之頻易
小兒侵淫瘡方三首
備急療小兒侵淫瘡方
取竈中黃土亂髮灰各三分研成粉以豬膏和塗之
差千金同亦治身赤腫起
又方
燒艾作灰傅之千金同
又方
以牛屎燒作灰傅之千金同
小兒䗩螋瘡方二首
備急療小兒䗩螋瘡繞身匝即死方
擣蒺藜葉傅之無葉子亦可使用千金同
又方
取鷰窠土研成粉以猪脂和塗之乾易千金同

靜嘉堂文庫所藏

小兒惡瘡方五首

文仲療小兒身中惡瘡方

取笋煑汁洗之又燒笋皮作灰傅之

古今錄驗療小兒惡瘡方

取豆豉熬令焦黃末以傅瘡差止千金同

又療小兒惡瘡匝身衆藥所不能療之方

取父根洗取汁以浴兒勿使母知良

又療小兒面及身上生瘡如火燒方

取黃米一升末以蜜水和塗之差爲度

又方 以赤地利擣末以粉之佳

小兒火灼瘡方二首

千金療小兒火灼瘡者一身盡有如麻豆或有膿汁乍痛乍痒方

甘草 芍藥 白斂 黃芩

黃連 黃蘗 苦參各半兩

右七味擣末以蜜和傅之日二夜一亦可作湯洗之

千金翼療小兒火瘡方

煑大豆濃汁溫洗之差亦令無瘢

小兒風㾦瘙痒方五首

廣濟療小兒風㾦浴湯方

柳木空中屑二升 蒴藋根切二升 鹽二合 櫨木切一升

右四味切以水二斗煑取一斗入鹽以洗浴頻爲之以差止

又療小兒壯熱隱㾦已服湯丸不消宜服竹瀝湯方

淡竹瀝一升二合 葛根汁五合 牛黃三大豆粒研

右三味相和與兒服一歲至五六歲一合至三合五合再服以意增減之

千金療小兒風瘙隱㾦方

靜嘉堂文庫所藏

蒴藋（物一外切） 防風 半夏 石南 秦椒
升麻 苦參 茵芋 芫花（一作莞蘇） 蒺藜子
蛇床子 黃礬石（燒） 枳實（各一兩）
右十三味切以酢漿三斗煮取一斗內礬石令少沸以浴之
又療小兒風癇隱疹方
牛膝末酒服方寸匕滿瘡多年不差擣末傅之主骨
疽癲病瘰癧絕妙
千金翼療隱疹方
巴豆五十粒去皮以水三升煮取一升半以綿內湯
中拭病上隨手滅神良
小兒痸氣陰癲方八首
小品療少小陰㿗白頭翁傅之神效方
生白頭翁根不問多少擣之隨偏處以傅之一宿當
作瘡二十日愈（一方三月上徐日取之）
千金療小兒狐疝傷損生癲方
半夏（洗一分） 芍藥 茯苓（各三分） 防風（一作防葵）
大黃（各二分） 桂心 椒（各一兩汗）
右七味擣散蜜丸如大豆以湯飲下一丸至二丸三丸日五服
以差為度
又方
桂心（三分） 地膚子（一分） 白朮（五分）
右三味擣蜜丸如小豆白酒服七丸日三服亦治大人
千金翼療小兒氣癲方
土瓜根 芍藥 當歸（各一兩）
右三味切以水二升煮取一升去滓分服五合日三
備急療小兒癲方

靜嘉堂文庫所藏

以蜥蜴一枚燒灰末以酒服之

灸足厥陰大敦左患灸右右患灸左各一壯即當差千金同

又方

古今錄驗療小兒陰癩方

狐陰一具(炙) 飛生蟲十四(枚) 桂心 附子(炮)

乾薑 蒺藜 消石(一作滑石) 細辛(各二分)

卷栢 桃人(去皮熬各六分)

右十味擣散蜜丸大豆許以飲下五丸至七丸再服差止

劉氏療小兒疝氣陰囊核腫痛灸法

如一歲兒患向陰下縫子下有穴灸三壯差五歲以上

即從陰上有穴灸之即愈

小兒陰瘡及腫方八首

千金療小兒陰瘡及腫方

取狼牙濃煮汁洗之

又方

黃連 胡粉(等分)

右二味末和以香脂油傅之差

備急療小兒陰瘡方

人屎燒作灰以傅之即差千金同

又方

猫兒骨燒作灰傅之即差(千金去猫骨灰傅之)

又療小兒歧股間連陰囊生瘡汁出先痒後痛十日五日自差

一月二十日復發連年不差者方

灸瘡搔去痂以帛拭令乾以蜜傅更作燒餅熟即以

餳塗上以熨之冷即止再度差千金同

又治小兒陰腫方

猪屎五升水煮沸布裹安腫上千金同

又方

灸大敦七壯差千金同

又方

擣蕪菁菜葉根薄之

靜嘉堂文庫所藏

小兒脫肛方六首

備急鼈頭丸療少小積痢久下下後餘脫肛不差腹中㽲肛中疼痛不得入者方

死鼈頭一枚炙令焦　小形蝟皮一枚炙令焦　磁石四兩　桂心三兩

右四味擣篩蜜丸如大豆三歲至五歲服五丸至十丸日三兒漸大以意加之千金同

又療小兒脫肛方

灸頂上旋毛中三壯即入

又方

灸尾翠三壯愈千金同

又方

灸臍中三壯愈千金云隨年壯

古今錄驗療小兒久痢脫肛方

東壁土五分　鼈頭一枚炙焦　五色龍骨五分　卷栢四分

右四味擣散以粉傅之按內之即差

又方

取鐵精粉傅內之差

小兒䘌蟲食下部方四首

千金療小兒蟲食下部方

胡粉熬　雄黃等分各末

右二味以著下部穀道中即差

又除熱結腸丸斷小兒熱下黃赤汁沫及魚腦雜血肛中瘡爛生䘌蟲䘌方

黃連　蘗皮　苦參　鬼臼

獨活　橘皮　芍藥　阿膠各二分炙

右八味擣篩以藍汁及蜜丸如小豆日服五丸冬天無藍汁可用藍子一合春蜜和丸一云三歲以下服三丸三歲以上服五丸五歲服十丸

又杏人湯方

杏人五十枚去皮尖　鹽一合

靜嘉堂文庫所藏

右二味以苦酒一升煑取一半量與服之

又療小兒下部被蟲食大腸赤瘡爛方

水銀一兩以棗水煑之取少許以唾研安著竹筒中

吹入下部中三度差

小兒疳濕瘡方六首

備急療小兒疳濕瘡方

以鐵上衣少許內下部中即差千金同

又方

自大椎數至第十五椎夾骨兩傍灸七壯不差加七壯

千金同

又方

艾葉一兩水一升煑取四合分三服差千金云艾葉切五升以水一斗煑取一升半分三服

又小兒疳瘡方

胡粉熬八分猪脂和塗之差爲度油亦得千金同一

又方

嚼栗子塗之差千金云爵麻子傅之日六七度

又方

羊膽二枚以醬汁和灌下部中猪膽亦得千金同

小兒蚘蟲方七首

千金療小兒蚘蟲方

楝木削上蒼皮以水煑取汁飲之量大小多少爲此

有小毒

又方

大麻子研取汁與飲之

又方

石榴根一把水五升煑取一升分二服

又小兒羸瘦有蚘蟲方

萑蘆二兩以水一升米二合煑取米熟去滓與服之

又方

萹蓄三兩水一升煑取四合分服之擣汁服亦佳

又方

東引茱萸根白皮四兩　桃白皮三兩

右二味切以酒一升二合漬之一宿漸與服取差

靜嘉堂文庫所藏

又方

蕪荑六分　狼牙四分　白斂二分

右三味擣末以苦酒和量與服之

小兒蟯蟲及寸白方五首

千金療小兒蟯蟲方

取猪膏服尤妙

又方

擣生槐實内下部中差爲度

又主寸白蟲方

東行石榴根一把水一升煑取三合分服

又方

桃葉擣絞取汁服之

又主小兒三蟲方

雷丸　芎藭各等分

右二味擣散服一錢匕日三

小兒瘻瘡方四首

千金療小兒瘻方

塚中石灰研傅之厚著之良

又方

燒桑根灰傅之幷燒烏羊角灰和傅之

又療小兒疽瘻方

丹砂　大黄各五分　雌黄　雄黄

藺茹各四分　礬石燒如馬齒者佳　莽草各三分　黄連六分

右八味㕮咀以豬脂一升三合微火煎三上三下膏成去滓下諸石藥末攪凝塗之差

備急若患漏瘡頭盡開出膿夜復合者方

大附子一顆内鯽魚腹中於炭火上燒灰研以傅之更擣蒜以封之良

小兒疥瘡方六首

范汪療小兒疥瘡雄黄膏方

靜嘉堂文庫所藏

雄黃研 雌黃研各一兩 烏頭一枚 松脂

亂髮各一雞子許 猪脂一升半

右六味和煎之候髮消烏頭色黃黑膏成去滓以傅之熟塗之

千金療疥方

以臭蘇和胡粉傅之差爲度

備急療疥方

燒竹葉灰以鷄子白和塗之以差爲度

又方

以亂髮灰以豬膏和傅之效

救急療疥瘡及小兒身上熱瘡並主之方

黃連 黃蘗 赤小豆 臭黃各一兩 水銀半兩研相和

右五味爲散以麻油和先淨洗瘡然後塗之甚佳

又療小兒瘡疥等神驗方

黃連 糯米粉各十二分 水銀八分碎 胡粉六分

吳茱萸 赤小豆各一兩

右六味擣散水銀手中和唾研如泥以猪脂并水銀成膏先洗瘡乾拭令淨以塗藥三兩度差忌猪鷄魚肉

小兒癬瘡方六首

集驗療小兒癬方

以蛇床子末以白膏和傅之亦主瘙妙

千金療小兒濕癬方

枸杞根擣末和臘月猪膏傅之一云酢和亦佳

又方

挑青皮擣末以醋和傅之日二

又方

煎馬尿洗之一方云治小兒體上習習

又方

揩破以牛鼻上津塗之

又方

狗屎灰和猪脂以塗之

小兒誤吞物方四首

靜嘉堂文庫所藏

小品療小兒誤吞鐵珠子如狸豆大者經年不以爲害後病瘦瘠食不生肌膚時下痢或寒熱服諸藥自療來反劇不瘥有師診之云是吞物不消作法服衆藥所吞物不去終不差令其家中察之云兒近歲常弄十六具鐵珠覺失一顆慮是吞之從來積歲實不以爲疑之師六診乃信是故令病矣爲處湯藥所患即差復與將療其兒肌膚充悅而忘說其方且記之又有一家女子六七歲許患腹痛其母與摩按之覺手下有一橫物在兒肉裏正平橫爾問兒曰那得鍼在肉中大驚怪脫衣看之肉完淨無有刺處按之兒亦不患鍼痛惟覺腹裏痛耳其母即以爪甲重重介之乃横物折爪下兩段亦不偏痛迎師診之共察若吞鍼刺物者其嬰兒時不經鯁礙惟恐養兒時母常帶鍼騾抱橫兒體鍼入兒肌膚中兒縱覺痛啼呼與乳卧息便止遂成不覺今因腹痛摩之知耳鐵得土木濕皆生屑易朽鍼在人肉中經數歲肉得血氣皆朽也故介之即折令患腹痛不安但療腹痛服温中湯下心腹痛差後長大嫁因産乳不聞道鍼處爲患故記之

千金療小兒吞鍼方

取磁石如棗核大吞之其鍼立出

又誤吞鐵等物方

艾蒿一把剉以水五升煮取一升頓服之即下

肘後療小兒誤吞梅李方

以少許水灌小兒頭承其水與飲之即出良

近効療小兒誤吞錢在喉中不出方

取麩炭末以指彈入喉中其兒當便咯出妙

小兒雜療方六首

劉氏療小兒上冷下熱上熱下冷難將息方

靜嘉堂文庫所藏

犀角末 甘草 生地黃各六分 芍藥五分
白朮 茯苓 梔子各三分 柴胡
人參 大黃 生薑各四分 黃芩二分
桂心一分
右十三味切以水三升煑取一升分溫服之
又療小兒身體滿氣急卧不得方
郁李人一合擣末和麪溲作餅子如常法與兒喫
微利即差
又方
郁李人末六分以水七合和調去滓煑粥與兒喫之
又療小兒油丹赤腫方
括樓三大兩以釅醋擣藥以傅之佳
又方
取蕎麥麪以醋和塗之差
又療小兒野雞下部痒悶方
枳實二兩 鬼箭羽 青木香 鬼臼各二兩
右四味擣爲末以釅醋和以青布裹以熨之有頭即破熨訖
令根拔去之差止甚佳

外臺祕要方卷第三十六

右迪功郎充兩浙東路提舉茶塩司幹辦公事張寔校勘

靜嘉堂文庫所藏